



BOVILIS VISTA ONCE SQ.

Ficha técnica

Composición:

Cada dosis contiene:

Virus de la Rinotraqueitis Infecciosa Bovina (IBR)	10 ^{3.6} TCID ₅₀ ,
Virus de la Diarrea Viral Bovina (DVB) Tipo 1 cepa Singer	10 ^{3.8} TCID ₅₀ ,
Virus de la Diarrea Viral Bovina (DVB) Tipo 2 Cepa 125A	10 ^{3.5} TCID ₅₀ ,
Virus de la Parainfluenza (PI3) Tipo 3	10 ^{5.1} TCID ₅₀ ,
Virus Respiratorio Sincitial Bovino (BRSV)	10 ^{3.8} TCID ₅₀ ,
<i>Mannheimia haemolytica</i>	1x10 ⁶ UFC,
<i>Pasteurella multocida</i>	8x10 ⁵ UFC.
Excipiente c.s.p.	1 dosis (2 ml).

Descripción del producto:

La vacuna reconstituida contiene cultivos vivos modificados del virus de la rinotraqueitis infecciosa bovina (IBR), virus de la diarrea viral bovina (BVD) (Tipos 1 y 2), virus de parainfluenza3 (PI3), virus respiratorio sincitial bovino (BRSV) y cultivos vivos avirulentos de *Mannheimia haemolytica* y *Pasteurella multocida*.

Indicaciones: Para la vacunación de bovinos sanos de 3 meses de edad o mayores, como una ayuda en la prevención de las enfermedades respiratorias causadas por IBR, BVD (Tipo 2), y BRSV; y como una ayuda en el control de las enfermedades causadas por BVD (Tipo 1), PI3, *Mannheimia haemolytica* y *Pasteurella multocida*. La duración de la inmunidad en las vías respiratorias (DOI) ha demostrado ser de por lo menos un año para IBR y BVD (Tipo 1 y 2) y al menos 16 semanas *Mannheimia haemolytica* y *Pasteurella multocida*.

Además, Bovilis Vista Once SQ se recomienda para la vacunación de vacas y vaquillas sanas antes de la monta como una ayuda en la prevención de la infección fetal, incluyendo la presencia de becerros persistentemente infectados a causa del virus de la BVD (Tipos 1 y 2); y como una ayuda en la reducción de abortos debidos a IBR. La duración de la inmunidad (DOI) en el aparato reproductor se ha demostrado que es de al menos 217 días para IBR y no menos de 206 días para la BVD (Tipos 1 y 2).



Seguro para su uso en novillas y vacas preñadas o terneras lactantes amamantadas de vacas gestantes siempre que las vacas y novillas en el hato se vacunen antes de la reproducción, dentro de los 12 meses anteriores, con cualquiera de las vacunas vivas modificadas IBR y BVD que contienen esta línea de productos.

Instrucciones de mezclado:

Rehidratar el vial de la vacuna liofilizada Bovilis Vista Once SQ con el diluyente incluido. Mezclar bien el vial reconstituido.

Instrucciones de uso:

Inyectar 2.0 ml por vía subcutánea a bovinos sanos de 3 meses de edad o mayores. Se recomienda la revacunación anual. Para la revacunación se puede administrar una dosis a intervalos más frecuentes basados en la evaluación del riesgo u otras condiciones de epidemia que existen o son reportadas en cada explotación. Consulte al Médico Veterinario.

Advertencias:

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Almacenar en refrigeración a 2 °- 8 ° C. No congelar.

Utilizar inmediatamente después de reconstituida; no guardar remanentes de la vacuna.

Quemar este frasco y todo el contenido que no se haya usado.

Utilizar solo en bovinos sanos. No vacunar dentro de los 21 días anteriores al sacrificio.

Riesgos en la salud fetal asociados con la vacunación de animales preñados con vacunas vivas modificadas no pueden ser determinados en forma absoluta por los estudios clínicos realizados para obtener el registro.

Las estrategias de manejo basadas en la vacunación de animales preñados con vacunas vivas modificadas deben de ser discutidas con su veterinario.

Si se presentan reacciones alérgicas, administre epinefrina.

Contiene penicilina y estreptomina como conservadores.

Precauciones

En caso de inoculación accidental en humanos, consulte a su médico.

Rehidrate la vacuna sólo con el diluyente que la acompaña.

Agite fuerte y constantemente para garantizar una adecuada distribución del antígeno.

Intervet S.A.
Av. Circunvalación del Club Golf
Los Incas 134, Torre 2, Of. 1901,
Santiago de Surco Lima - Perú
T +51 1 411 5100
www.msd-animal-health.com.pe



Almacenamiento

Almacenar en refrigeración a 2 °- 7 ° C. No congelar.

Periodo de retiro:

No vacunar dentro de los 21 días anteriores al sacrificio.

Presentación:

Frasco por 10 (20 ml) y 50 (100 ml) dosis.

FABRICADO POR:

Intervet Inc.

Omaha, NE 68103

U.S. Vet Lic. No. 165A

IMPORTADO POR:

Intervet S.A.

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Of. 1901

Santiago de Surco, Lima - Perú

Bajo Licencia de Intervet International B.V.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta médica.

USO VETERINARIO

Registro SENASA: B.01.B.02.I.1105