



CEPRAVIN DC

Ficha técnica

Infusión intramamaria de larga acción que contiene Cefalonium, una Cefalosporina semisintética, formulada para suministrar niveles de antibiótico hasta por 10 semanas en la ubre seca.

El Cefalonium es una Cefalosporina de amplio espectro, que tiene actividad bactericida contra la mayoría de los microorganismos asociados con la mastitis bovina. Esta actividad antibacteriana no es interferida por la presencia de Leche.

Composición

Cada jeringa contiene:

Cefalonium 250 mg

Excipientes c.s.p. 3 g

Especies de destino

Vacas en secado

Indicaciones

Tratamiento de rutina de la Vaca en seca, para tratar infecciones subclínicas. El producto es activo contra *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Corynebacterium ulcerans*, *Arcanobacterium pyogenes*, *Streptococcus uberis*, *E. coli*, *Proteus spp*, *Klebsiella spp* y *Citrobacter spp*.

Aplicar al momento del secado de las ubres, para reducir el riesgo de mastitis que comúnmente ocurre al momento del parto.

Método y vía de administración

1. Antes de la aplicación, el pezón debe ser completamente ordeñado, limpiado y desinfectado.
2. Retirar la tapa completamente sosteniendo el cilindro de la jeringa firmemente en una mano y con el dedo pulgar empujar la tapa hasta que caiga. Evitar contaminar la boquilla de la jeringa.
3. Aplicar en el canal del pezón de cada cuarto el contenido de una jeringa, inmediatamente después del último ordeño de la lactancia.



4. Después de la aplicación, es aconsejable sumergir el pezón en una preparación antiséptica, especialmente diseñada para este propósito

Contraindicaciones

No administrar a animales con hipersensibilidad conocida a antibióticos cefalosporinas y otros antibióticos β -lactámicos.

No debe usarse en vacas lactantes.

Reacciones adversas

Si observa cualquier efecto adverso, por favor informe del mismo a su veterinario.

Advertencias especiales

Ninguna conocida

Tiempo de retiro

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 21 días después de finalizado el tratamiento.

La leche producida durante las 96 horas siguientes al parto no debe darse para consumo humano.

Si el parto transcurre antes de los 54 días, la leche solo podrá utilizarse 54 días más 96 horas desde el tratamiento.

Almacenamiento

No almacenar a temperaturas superiores a 30 °C.

Presentación

Caja con 20 jeringas x 3 g.

Intervet S.A.
Av. Circunvalación del Club Golf
Los Incas 134, Torre 2, Of. 1901,
Santiago de Surco, Lima - Perú
T +51 1 411 5100
www.msd-animal-health.com.pe



FABRICADO POR:

Schering-Plough Santé Animale, Segré, Francia.

Intervet International GmbH. – Unterschleißheim – Alemania.

IMPORTADO POR:

Intervet S.A.

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Of. 1901,

Santiago de Surco, Lima - Perú.

Bajo Licencia de Intervet International B.V.,

Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta médica.

USO VETERINARIO

Registro SENASA: F.95.05.I.0021