



COCCIVAC D2

Ficha técnica

Composición

Cada dosis de vacuna viva contiene:

<i>Eimeria acervulina</i>	≥ 600 Oocistos
<i>Eimeria maxima</i>	≥ 200 Oocistos
<i>Eimeria mivati</i>	≥ 400 Oocistos
<i>Eimeria tenella</i>	≥ 200 Oocistos
<i>Eimeria necatrix</i>	≥ 400 Oocistos
<i>Eimeria brunetti</i>	≥ 200 Oocistos
Excipientes c.s.p.	1 dosis.

Indicaciones

En pollitas de reemplazo (ponedoras comerciales y reproductoras) la prevención de la coccidiosis mediante el desarrollo de inmunidad contra las coccidias *E. acervulina*, *E. maxima*, *E. mivati*, *E. tenella*, *E. necatrix* y *E. brunetti*.

Administración:

Coccivac-D2 debe ser administrada mediante una Spray cabinet al primer día de edad o en el alimento a los cuatro días de vida, o en el agua de bebida entre el 4 y los 14 días de edad (preferiblemente a los 10 días).

Administración por aspersion en el alimento.

Para vacunación de las pollitas al 4 día de edad.

1. No usar ninguna medicación ni desinfectante en el agua de bebida durante, ni 24 horas antes o después de la vacunación.
2. Diluya la vacuna en una proporción de 1000 dosis en 400 ml. de agua sin cloro, mezcle bien y coloque en un rociador de presión o aspersor limpio.
3. Rocíe la vacuna diluida sobre la superficie del alimento, agitando el rociador durante la administración.
4. Para un mejor resultado, la vacuna debe ser rociada sobre todo el alimento.
5. Evite humedecer excesivamente el alimento, una apropiada aplicación debe humedecer solamente la superficie del alimento.
6. Permita que las aves tengan el suficiente tiempo para ingerir los oocistos en el alimento, antes de agregar más comida sobre las bandejas o el papel.



Administración en Spray cabinet

Para vacunación en pollitas de un día de edad.

1. Use la vacuna diluida tal como se indique en la máquina de rociado grueso.
2. Cuando utilice una Spray cabinet, se recomienda diluir 1000 dosis en 210 ml. Colorante rojo puede ser colocado como marcador.
3. Coloque la vacuna diluida en el reservorio de presión del aparato rociador.
4. Ajustar la máquina como se indica en las instrucciones de operación.
5. Colocar cajas conteniendo 100 pollitas cada una, en la cinta transportadora o en la máquina y activar el rociador.
6. Usando la Spray cabinet, cada caja de 100 pollitas recibirá 21 ml de la dilución.

Información general:

1. Vacunar únicamente pollitas sanas
2. Administrar por cabina de Spray en aves de un día de edad o rociar en el alimento al día 4 de edad.
3. Las aves pueden ser criadas en papel, pero este se debe retirar y las pollitas pasar a la cama al cuarto día después de la vacunación y tener acceso a sus heces ya que la reinfección es necesaria para adquirir la inmunidad.
4. Las pollitas criadas en baterías o jaulas solo se pueden inmunizar de modo efectivo, con Coccivac-D2, si son colocadas en la cama a más tardar 4 días después de la vacunación.
5. La humedad es necesaria para que los oocistos esporulen, si las condiciones de la cama son extremadamente secas durante el periodo de inmunización, se recomienda rociarla ligeramente con agua.
6. Si la vacuna produce una reacción notable, esta suele ocurrir entre los 12 y 14 días después de la vacunación. No trate para coccidiosis a menos que la elevada morbilidad o mortalidad sean atribuidas a coccidiosis. Una vez hecho un diagnóstico positivo trate con un anticoccidial en el agua de bebida, medicando por 48 horas usando la dosis más baja recomendada por el fabricante.
7. Una vez abierto el vial, use todo el contenido.

Precauciones

1. Manténgase fuera del alcance de los niños
2. Venta bajo fórmula del Médico Veterinario
3. Almacénese refrigerado entre 2° a 7° C
4. NO CONGELAR
5. Queme el envase y todo el contenido no utilizado



Uso de alimento medicado y Coccivac-D2

La vacuna Coccivac-D2 no se recomienda para usar en aves que reciben alimento con coccidiostato o niveles altos de antibióticos. Después de la vacunación puede ser necesario usar niveles altos de medicamentos para el tratamiento de enfermedades diferentes a coccidiosis, si se usan drogas con actividad coccidicida en la primera o segunda semana después de la vacunación con Coccivac®-D2, se recomienda revacunar.

La capacidad de Coccivac-D2 para producir óptimos resultados depende de muchos factores incluyendo las condiciones de manejo, almacenamiento, administración de la vacuna, salud y capacidad de respuesta inmune de las aves, lo mismo que el grado de exposición en el campo. Por lo tanto, se deben seguir las instrucciones con extreme cuidado.

Presentación:

Caja de 10 frascos de 1,000 dosis cada uno.
Caja de 10 frascos de 5,000 dosis cada uno.

Fabricado por:

Intervet Inc.
Omaha, NE 68103 USA
Licencia Vet de EE.UU. No. 165A

Importado y distribuido por:

Intervet S.A.

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Of.1901.
Santiago de Surco, Lima - Perú.
Bajo Licencia de Intervet International B.V.,

USO VETERINARIO

Registro SENASA: B.01.7.01.I.1270
