



EXCELLER

Ficha técnica.

ENDECTOCIDA INYECTABLE PARA BOVINOS Y PORCINOS

Formula

Cada 100 mL contiene:

Doramectina	1,0 g
Vehículo c.s.p.	100,0 mL

Solución inyectable de avermectina para bovinos y porcinos.

Indicaciones:

Bovinos:

EXCELLER está indicado para el tratamiento y control de parásitos gastrointestinales y pulmonares, garrapatas, miasis (gusaneras), larvas, piojos, ácaros de la sarna.

Helmintos gastrointestinales (adultos y larvas de 4ª estadio):

Ostertagia ostertagi, *Haemonchus spp.*, *Haemonchus contortus* (adultos), *Haemonchus similis* (adultos), *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Cooperia punctata*, *Cooperia pectinata* (adultos), *Cooperia spp.*, *Bunostomum phlebotomum* (adultos), *Oesophagostomum radiatum*, *Strongyloides papillosus* (adultos), *Trichuris spp.* (adultos).

Helmintos pulmonares:

Dictyocaulus viviparus.

Garrapatas:

Boophilus microplus.

Larvas:

Larvas de *Dermatobia hominis*.

Miasis (gusaneras cutáneas):

Larvas de la mosca *Cochliomyia hominivorax*.

Piojos:

Linognathus vituli, *Haematopinus eurysternus*, *Solenopotes capillatus* y *Damalimia bovis*.

Ácaros:

Psoroptes bovis.

Intervet S.A.

Av. Circunvalación del Club Golf
Los Incas 134, Torre 2, OF. 1901
Santiago de Surco, Lima.
T +51 1 411 5100

www.msd-animal-health.com.pe



Porcinos:

EXCELLER está indicado para el tratamiento y control de parásitos gastrointestinales, pulmonares y renales, piojos y ácaros de la sarna.

Helmintos gastrointestinales (adultos y larvas de 4^a estadio):

Hyostrongylus rubidus, *Ascaris suum*, *Strongyloides ransomi* (adultos), *Oesophagostomum dentatum*, *Trichuris suis*.

Helmintos pulmonares:

Metastrongylus spp.

Helmintos renales:

(adultos):

Stephanurus dentatus.

Piojos:

Haematopinus suis.

Ácaros:

Sarcoptes scabiei.

Posología y modo de usar:

Bovinos:

Administrar EXCELLER por la vía subcutánea en la dosis de 1,0 mL para cada 50 kg de peso corporal (200 mcg de doramectina por kg de peso corporal):



Tabla de Dosificaciones para bovinos

Peso (kg)	Dosis (mL)
Hasta 50	1
51 - 100	2
101 - 150	3
151 - 200	4
201 - 250	5
251 - 300	6
301 - 350	7
351 - 400	8
401 - 450	9
451 - 500	10
501 - 550	11
551 - 600	12

Porcinos:

Administrar EXCELLER por vía intramuscular en la dosis de 1 mL para cada 33 kg de peso corporal (300 mcg de doramectina por kg de peso corporal).

Tabla de Dosificaciones para porcinos

Peso (kg)	Dosis (mL)
Hasta 33	1,0
34 - 50	1,5
51 - 66	2,0
67 - 82	2,5
83 - 99	3,0

Intervet S.A.

Av. Circunvalación del Club Golf
Los Incas 134, Torre 2, OF. 1901
Santiago de Surco, Lima.
T +51 1 411 5100

www.msd-animal-health.com.pe



Periodo de retiro y precauciones:

- Los animales destinados al consumo humano no deben ser sacrificados antes de 28 días después de la última aplicación del producto;
- Volúmenes por encima de 5 mL preferiblemente deben dividirse en más de un sitio de aplicación.
- La leche de los animales tratados no debe ser destinado al consumo humano antes de 10 días después de la última aplicación del producto;
- No lo guarde o aplique junto con alimentos, bebidas, productos de higiene y productos domésticos;
- Ajuste la dosis de acuerdo con el peso para cada animal.

Presentación

Frascos de vidrio de 50, 200 y 500 mL.

Almacenamiento:

Mantener protegido de la luz y a una temperatura inferior de 25 °C.

FABRICADO POR:

VALLÉE S/A – BRASIL

Montes Claros – Minas Gerais – Brasil.

IMPORTADO POR:

Intervet S.A.

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, OF. 1901
Santiago de Surco. Lima - Perú.

Bajo Licencia de Intervet International B.V.,

Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta médica.

USO VETERINARIO

Registro SENASA: F.54.01.I.0248