



# FORTEGRA

## Ficha técnica

### COMPOSICIÓN

Cada dosis de vacuna contiene:

Eimeria acervulina	≥ 600 Oocistos,
Eimeria máxima	≥ 200 Oocistos,
Eimeria máxima MFP	≥ 100 Oocistos,
Eimeria mivati	≥ 400 Oocistos
Eimeria tenella	≥ 200 Oocistos.
Excipientes c.s.p.	1 dosis

### INDICACIONES

Para la vacunación de pollos saludables de un día de edad, mediante la administración por aspersión en cabina, como ayuda en la prevención de la coccidiosis provocada por *E. mivati* y *E. tenella* y como una ayuda en la reducción de lesiones relacionadas con *E. acervulina* y *E. maxima*.

### CONTRAINDICACIONES

Este producto normalmente no se recomienda para su uso con alimentos pre-iniciadores o iniciadores que contengan coccidiostatos.

### ESPECIE

Aves: pollitos de 1 día de edad.

### DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN

Suspensión vacunal para la administración por aspersión en cabina. La vacuna debe de ser preparada (o mezclada) en una proporción de 210 ml de agua destilada por 1000 dosis de vacuna. Cada 100 pollos deben de recibir 21 ml de solución de vacuna, administrada por aspersión en cabina, (se puede utilizar colorante como un marcador).



## **PROGRAMAS DE VACUNACIÓN**

Se deben de considerar muchos factores en la determinación del programa de vacunación para una granja en particular u operación avícola. Para que la vacuna sea totalmente efectiva, la vacuna debe de ser administrada en aves receptivas, saludables, que se encuentren en un ambiente adecuado bajo un buen manejo. Además, la respuesta puede ser modificada por la edad de las aves y su estado de inmunidad.

Vacunaciones bajo condiciones de campo rara vez producen una protección completa en todas las aves de un mismo grupo. El grado de protección requerida varía dependiendo del tipo de operación y del grado de exposición al cual las aves estén usualmente expuestas y por lo tanto puede ser necesario un programa de vacunación periódica.

## **INSTRUCCIONES SOBRE SU CORRECTA ADMINISTRACIÓN**

Únicamente vacune aves saludables. Las aves deben de tener acceso a sus heces, ya que se requiere de una serie de reinfecciones para inducir la inmunidad. La capacidad de esta vacuna para producir resultados satisfactorios depende de muchos factores, pero no limitado a las condiciones de almacenamiento y manejo por parte del usuario, administración de la vacuna, salud y respuesta en forma individual y grado de exposición al campo.

Por lo tanto, las instrucciones para su uso deben de ser seguidas cuidadosamente. Consulte a su patólogo avícola para más recomendaciones basadas en las condiciones de su área en cualquier momento determinado.

## **PERIODO DE RETIRO**

No vacunar dentro de los 21 días anteriores al sacrificio.

## **ADVERTENCIAS**

1. Almacénese entre 2 y 7°C. No se congele.
2. Protéjase de la luz.
3. Agítese bien antes de aplicar.
4. Solo para uso veterinario.
5. Manténgase fuera del alcance de los niños.
6. Utilizar todo el contenido cuando se abra por primera vez.
7. Incinerar los envases y todos los contenidos sin utilizar.
8. Esta vacuna contiene gentamicina como agente conservador.

**Intervet S.A.**  
Av. Circunvalación del  
Club Golf Los Incas  
134, Torre 2, Oficina  
1901. Santiago de  
Surco, Lima. - Perú.  
T +51 1 411 5100  
[www.msd-animal-health.com.pe](http://www.msd-animal-health.com.pe)



**Presentación:**

Caja de 10 viales de 1,000 dosis cada uno.  
Caja de 10 viales de 10,000 dosis cada uno.

**Fabricado por:**

Intervet Inc.  
Omaha, NE 68103 USA  
Licencia Vet de EE. UU. No. 165A

**Importado por:**

**Intervet S.A.**

Av. Circunvalación del Club Golf los Incas 134, Torre 2, Oficina 1901.  
Santiago de Surco, Lima. - Perú.  
Bajo Licencia de Intervet International B.V.,

**USO VETERINARIO**

**Registro SENASA: B.01.L.01.I.1149**

---