



Nobilis AE+POX

Ficha técnica

Composición

La vacuna Nobilis AE + POX es una vacuna liofilizada para la inmunización activa de pollitas y reproductoras de reemplazo y pavos contra la Encefalomiелitis aviar y la Viruela aviar desarrollada en huevos SPF. La pastilla vacunal contiene estabilizadores y sulfato de Gentamicina.

Su presentación es en dos unidades separadas. Una que contiene el vial de la vacuna y la otra que contiene una botella con el diluyente estéril (UNISOL)

Cada dosis contiene:

Virus de Encefalomiелitis aviar, cepa 1143 (Calnek) $\geq 2.5 \log_{10} \text{DIE}_{50}$

Virus de la Viruela aviar, cepa Gibbs $\geq 2.8 \log_{10} \text{DIE}_{50}$

Excipientes c.s.p. 1 dosis

Indicaciones

Para la inmunización activa de pollitas y reproductoras de reemplazo y pavos contra la EA y la Viruela aviar. Las aves vacunadas son protegidas de la caída de postura propia de esta enfermedad, y la progenie de las aves vacunadas son protegidas contra la EA durante las primeras semanas de vida, vía transmisión de inmunidad materna.

Administración

Aplique la vacuna en la membrana del ala utilizando el aplicador proporcionado

Preparación de la vacuna

Un vial de vacuna debe reconstituirse con el contenido del frasco de diluyente inmediatamente antes del uso. Los aplicadores deben sumergirse en la vacuna



y entonces deben aplicarse en la membrana del ala. Deben evitarse áreas emplumadas del tejido

Aproximadamente de 7-10 días después de la vacunación, algunas aves deben examinarse para saber si la vacuna surtió efecto o no. Un efecto positivo es la hinchazón superficial y formación de costras en el sitio de la vacunación. Las costras generalmente se caen a las 2-3 semanas después de la vacunación

La inmunidad plena se establece en 3 semanas después de la vacunación.

Programas de Vacunación

El pollo debe vacunarse entre las 8 a 16 semanas de vida.
El pavo debe vacunarse entre las 18 a 26 semanas de vida.

Período del retiro: ninguno

Precauciones y Advertencias

- **SÓLO VACUNE LOS ANIMALES SANOS.** Aunque la enfermedad no sea evidente, la coccidiosis, infecciones de Mycoplasma, la enfermedad de Marek y otras enfermedades, pueden causar complicaciones o pueden reducir la efectividad de la inmunidad.
- Todos los pollos susceptibles deben vacunarse al mismo tiempo.
- No use menos de una dosis por ave
- No vacune dentro de las 4 semanas antes del periodo de producción
- No vacune los pollos con menos de 8 semanas y pavos con menos de 18 semanas
- Quemar los envases y el contenido no utilizado



Condiciones de almacenamiento

La vacuna liofilizada debe guardarse entre 2 y 8°C en la oscuridad. En el momento de ser reconstituida debe protegerse del calor y debe usarse dentro de unas 2 horas

Presentaciones

Cajas con viales, cada una contiene 1 000 dosis

Fabricado por:

Intervet International B.V. Boxmeer - Holanda

Importado por:

Intervet S.A.

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Of.1901

Santiago de Surco, Lima Perú

Bajo Licencia de Intervet International B.V.,

Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta médica.

USO VETERINARIO

Registro SENASA: B.01.1.01.I.395