



# NOBILIS COR4+IB+ND+EDS

## Ficha técnica

Vacuna inactivada para inmunizar aves contra la Coryza infecciosa causada por los serotipos A, B, C y variante B del *Avibacterium paragallinarum*; para la protección contra el virus de Bronquitis Infecciosa (causado por el serotipo Massachussets), contra la enfermedad de Newcastle y contra el Síndrome de baja postura.

---

### Composición:

*Avibacterium paragallinarum*

Por dosis de 0.5 ml:

Cepa 083	(serotipo A)	al menos 1 CPD70*
Cepa Spross	(serotipo B)	al menos 1 CPD70*
Cepa H-18	(serotipo C)	al menos 1 CPD70*
Cepa 48	(serotipo variante B)	al menos 1 CPD70*

**\*Dosis protectora en pollos**

IBV cepa M41:	$\geq 2.0 \log_2$ HI unid.	aumentadas en aves primovacunadas.
EDSV'76 cepa BC14:	$\geq 3.2 \log_2$ HI unidades	
NDV cepa Clone 30:	$\geq 4.0 \log_2$ HI unidades por 1/50vo de una dosis o $\geq 50 DP_{50}$ por unidad.	

### Formulación:

Los componentes activos están suspendidos en un adyuvante oleoso

### Indicaciones:

Se usa para la inmunización activa de las pollitas de reemplazo con el fin de reducir signos clínicos de Coryza infecciosa causada por *Avibacterium paragallinarum*, y para la protección contra el virus de Bronquitis Infecciosa (causado por el serotipo Massachussets), contra la enfermedad de Newcastle y contra el Síndrome de baja postura. Los efectos protectores son demostrados durante al menos un período de postura.



**Edad de vacunación:**

Inyectar a las aves de 14 semanas de edad en adelante y no más tarde de 4 semanas antes del inicio de la postura

Para una óptima protección contra Coryza infecciosa las aves deben ser vacunadas con Nobilis Coryza saponina al menos 6 semanas antes de la vacunación con Nobilis COR4+IB+ND+EDS. Para un óptimo efecto repotenciador contra Bronquitis Infecciosa y la enfermedad de Newcastle, las aves deben ser primovacunados con vacunas vivas al menos 4 semanas antes de la vacunación con Nobilis COR4+ IB +ND EDS. No es necesario un primovacunación para el Síndrome de Baja Postura

**Via de administración:**

Inyección subcutánea en la parte baja del cuello en pollos de 14 semanas en adelante y no más tarde de 4 semanas antes del inicio de la postura

**Dosis:**

0.5 ml por ave

**Almacenamiento**

2 - 8 °C. Proteger de la luz. No congelar.

**Precauciones especiales:**

- Antes de usar la vacuna, permitir a esta que alcance una temperatura ambiente (15 - 25°C). Agitase vigorosamente (enérgicamente) previo y durante la aplicación. Utilice jeringas y agujas estériles.
- No se debe usar en gallinas en postura
- No se debe mezclar con otras vacunas.
- En caso de accidentalmente inyectarse a si mismo, busque un consejo médico inmediatamente y muestre la indicación o la etiqueta al médico.

**Periodo de retiro**

Cero días

**Contraindicaciones y advertencias:**

Cualquier vacuna no usada o materiales sobrantes deben ser desechados de acuerdo con los requerimientos nacionales

**Presentación**

Botellas PET de 500ml – 1000 dosis.

**Intervet S.A.**  
Av. Circunvalación del Club Golf  
Los Incas 134, Torre 2, Of.1901  
Santiago de Surco, Lima Perú  
T +51 1 411 5100  
[www.msd-animal-health.com.pe](http://www.msd-animal-health.com.pe)



**FABRICADO POR:**

Intervet International B.V. Boxmeer - Holanda

**IMPORTADO POR:**

**Intervet S.A.**

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Of.1901

Santiago de Surco, Lima Perú

Bajo Licencia de Intervet International B.V.,

Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta médica.

**USO VETERINARIO**

**Registro SENASA: B.01.7.01.I.0785**