



# NOBILIS CORYZA (Saponina)

## Ficha técnica

Vacuna inactivada para inmunizar aves contra la infección por Coryza. La vacuna contiene bacterias inactivadas de los serotipos A, B y C del *Avibacterium paragallinarum*.

---

### **Composición:**

Por dosis:

*Avibacterium paragallinarum*:

Cepa 083 (Serotipo A)	al menos 1 Dosis protectora 70% de pollos
Cepa Spross (Serotipo B)	al menos 1 Dosis protectora 70% de pollos
Cepa H-18 (Serotipo C)	al menos 1 Dosis protectora 70% de pollos
Excipientes c.s.p.	1 dosis (0.25 ml)

### **Formulación:**

Los componentes activos están suspendidos en un adyuvante de **saponina acuoso**.

### **Indicaciones:**

Protección contra la infección por *Avibacterium paragallinarum* en pollas de reemplazo.

Las pollitas son vacunadas dos veces para estimular una protección homóloga (serotipo - específico) contra el serotipo incorporado en la vacuna, por un periodo de al menos 52 semanas post vacunación.

### **Edad de vacunación:**

Inyectar a las aves entre 8 - 10 semanas de edad con 0.25 ml de vacuna y revacunar a más tardar a las 4-6 semanas con la Nobilis COR4+IB+ND+EDS antes del período de producción de huevos. El intervalo entre las dosis debe ser al menos de 4 -6 semanas.



**Vía de administración:**

Inyección intramuscular o por vía subcutánea en el cuello

**Dosis:**

0.25 ml por ave.

**Periodo de retiro:**

Ninguno

**Presentación:**

Frascos de 250 ml conteniendo 1000 dosis

**Almacenamiento:**

2- 8 °C y evitar el congelamiento

**Precauciones:**

- Vacunar sólo animales saludables
- Antes de su uso, la vacuna debe estar a temperatura ambiente (20 – 25°C)
- Agitar bien el frasco de vacuna antes de su uso
- Usar equipo de inyección esterilizado
- Una vez abierta la vacuna utilizar todo el contenido
- Después de abierto los envases de la vacuna éstos deben usarse en un período no mayor a tres horas
- No mezclar con otras vacunas
- Si el personal se inyectara por accidente, podría ocasionarse una reacción local. Se recomienda acudir e informar al doctor que la vacuna es una emulsión acuosa.

**Contraindicaciones y advertencias:**

Cuando se usa de acuerdo con las instrucciones, ninguna

**Información adicional:**

Los frascos usados y parcialmente usados deben desecharse de acuerdo con las regulaciones locales.

**Intervet S.A.**  
Av. Circunvalación del Club Golf  
Los Incas 134, Torre 2, Of.1901  
Santiago de Surco, Lima Perú  
T +51 1 411 5100  
[www.msd-animal-health.com.pe](http://www.msd-animal-health.com.pe)



**FABRICADO POR:**

Intervet International B.V. Boxmeer - Holanda

**IMPORTADO POR:**

**Intervet S.A.**

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Of.1901

Santiago de Surco, Lima Perú

Bajo Licencia de Intervet International B.V.,

**Mantener fuera del alcance de los niños.**

**Venta bajo receta médica.**

**USO VETERINARIO**

**Registro SENASA: B.01.4.01.I.0656**