



# NOBILIS GUMBORO D78

## Ficha técnica

### **Composición**

La vacuna Nobilis Gumboro D78 es una vacuna activa liofilizada contra la enfermedad infecciosa de la Bursa (Gumboro), desarrollada en huevos embrionados. La pastilla vacunal liofilizada contiene estabilizadores y gentamicina.

Cada dosis contiene:

Virus vivo de la enfermedad de Gumboro cepa D78  $\geq 4,0 \log^{10}$  DICT<sub>50</sub>

### **Indicación**

Inmunización de los pollos contra la enfermedad de Gumboro

### **Administración**

La vacuna puede ser administrada a través de:

Agua de bebida, La vacuna deberá ser disuelta en una cantidad de agua, la cual deberá ser consumida por los animales dentro de aproximadamente dos horas.

Vía Spray gota gruesa, debe ser disuelta en agua en una cantidad de 1000 dosis por litro. Debe ser diseminada con un equipo spray sobre una distancia de las aves de 30 a 40 cm.

Vía Oculo-nasal, La vacuna debe ser disuelta en el diluyente Solvens óculo nasal de Intervet (usualmente 30 ml por 1000 dosis) y administrar con un gotero estandarizado. Una gota debe ser aplicada en las fosas nasales u ojo.

### **Programa de Vacunación**

La vacuna puede ser administrada a aves de 8 – 28 días de edad por el agua de bebida. La cepa D78 es efectiva para encarar niveles de anticuerpos maternos que usualmente existen en parvadas entre 8 – 28 días de edad. El tiempo óptimo de vacunación depende de la altura del nivel de anticuerpos. En caso los niveles de anticuerpos sean muy variable es recomendado vacunar a los pollos dos veces con un intervalo de una semana.



La vacuna Nobilis Gumboro cepa D78 puede ser administrada a aves de 1 día de edad por vía ocular y spray a aves con pocos o sin anticuerpos maternos.

### **Inmunidad**

Los primeros signos de la respuesta del anticuerpo son observados a la semana después de la vacunación.

### **Reacción a la vacunación**

No se han observado reacciones posteriores a la vacunación de pollos saludables.

### **Período de Retiro**

Ninguno

### **Precauciones**

- Lavar y desinfectar manos y equipo después de la vacunación. Cualquier vacuna excedente deberá ser destruida mediante el hervido o incinerado.
- Vacunar solamente animales sanos.
- Cada frasco deberá ser usado inmediatamente después de abierto.

### **Condiciones de Almacenamiento**

Guardar en un lugar oscuro entre 2° y 8° C.

### **Presentaciones**

Frascos de 1000, 2500, 5000 dosis en cajas de 10 frascos.

### **Fabricado por:**

Intervet International B.V. Boxmeer - Holanda

**Intervet S.A.**  
Av. Circunvalación del Club Golf  
Los Incas 134, Torre 2, Of.1901  
Santiago de Surco, Lima Perú  
T +51 1 411 5100  
[www.msd-animal-health.com.pe](http://www.msd-animal-health.com.pe)



**Importado y distribuido por:**

**Intervet S.A.**

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Of.1901

Santiago de Surco, Lima – Perú.

Bajo Licencia de Intervet International B.V.,

Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta médica.

**USO VETERINARIO**

**Registro SENASA: B.01.1.01.I.450**