



NOBILIS IBMULTI+ND

Ficha técnica

Contiene dos cepas inmunogénicas del virus de Bronquitis Infecciosa IBV (serotipo *Massachussets* y una cepa variante perteneciente al serotipo D207 / D274) y una cepa del virus de la enfermedad de Newcastle NDV.

Composición

Ingredientes Activos

(Por dosis como fue medido en la prueba respectiva de potencia)

IBV cepa M41:	induciendo	$\geq 5.5 \log_2$ unidades VN*
IBV cepa 274:	induciendo	$\geq 4.0 \log_2$ unidades VN*
NDV Cepa Clone 30:	conteniendo	$\geq 50 \text{ PD}_{50}^{***}$ unidades
Excipientes c.s.p.	Induciendo	$\geq 4,0 \log_2$ Unidades HI por 1/50 de dosis. 0.5 ml /1 dosis

*VN: Virus neutralización, **HI: Hemaglutinación inhibida

**PD₅₀: Dosis protectora media

Formulación:

Emulsión para inyección (Agua en aceite).

Indicaciones para el uso

Vacunación de pollitas de reemplazo contra la enfermedad causada por los virus de Bronquitis Infecciosa serotipo Massachusetts y cepas variantes; virus de la enfermedad de Newcastle y el virus del Síndrome de baja de postura.



Edad de vacunación

Debe administrar a aves de alrededor 14-20 semanas de edad, pero no menos de cuatro semanas antes del período esperado de postura.

Para un efecto óptimo de reforzamiento, las aves deben ser preparadas con vacunas activas contra la Bronquitis Infecciosa Y Enfermedad de Newcastle.

Vía de administración

Inyección de 0,5 vía intramuscular en los músculos de la pierna o en el pecho o subcutánea en la parte baja del cuello.

Almacenamiento

Almacenar entre +2 y +8° C. No congelar. Proteger de la luz solar.

Precauciones especiales

- Vacunar sólo animales sanos
- Antes de usar la vacuna permita que alcance la temperatura ambiente (15° - 25° C)
- Agitar bien la botella antes de usar
- Usar equipo de inyección esterilizado
- Usar el contenido completo una vez abierta la botella
- No mezclar con otras vacunas
- Puede ocurrir una reacción local si accidentalmente el vacunador se inyecta a sí mismo o a algún espectador. Se recomienda buscar la ayuda de un médico inmediatamente, teniendo cuidado de informarle que la vacuna es una emulsión de agua-en-aceite.

Presentación

Frascos PET conteniendo 500 ml suficientes para 1000 dosis

Precauciones para la disposición del producto no usado o material de desecho

No se requiere ninguna precaución especial.

Descartar el producto por los canales apropiados.

Intervet S.A.
Av. Circunvalación del Club Golf
Los Incas 134, Torre 2, Of.1901
Santiago de Surco, Lima Perú
T +51 1 411 5100
www.msd-animal-health.com.pe



Fabricado por:

Intervet International B.V. - Boxmeer – Holanda

Importado por:

Intervet S.A.

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Of.1901
Santiago de Surco, Lima Perú

Bajo Licencia de Intervet International B.V.

Mantener fuera del alcance de los niños

Venta bajo receta médica

Solo para Uso Veterinario

Registro SENASA: B.01.2.01.I.1265.