



NOBILIS ND CLONE 30

Ficha técnica

Composición

Vacuna activa liofilizada conteniendo la cepa Clone 30, lentogénica y purificada en placa, para la prevención de la enfermedad de Newcastle ENC. La pastilla vacunal contiene: estabilizadores y sulfato de gentamicina.

Virus de ENC cepa Clone 30 $\geq 6,0 \log_{10} \text{DIE}_{50}$

Excipientes c.s.p. 1 dosis

Indicaciones

Como vacunación primaria y revacunaciones de pollos para la prevención de la Enfermedad de Newcastle.

Administración

La vacuna puede ser administrada por spray, vía óculo nasal o a través del agua de bebida. Por vía óculo nasal, necesita un diluyente especial, el Solvens óculo nasal se encuentra disponible.

Programa de vacunación

Broiler: Vacunación desde el día de edad, vía spray o instilación óculo/nasal.

Ponedoras y reproductoras: Vacunación desde el día de edad, vía spray o instilación óculo/nasal.

Revacunación aproximadamente a las 4 - 6 semanas de edad vía instilación óculo/nasal, por spray ó por agua de bebida.

El tiempo óptimo y el método de administración, la revacunación depende de la situación local.

Se recomienda seguir la recomendación del Veterinario avícola.



Inmunidad y reacción postvacunal

La duración y la intensidad de la reacción de la vacuna y el establecimiento de una sólida inmunidad, generalmente depende de los anticuerpos maternos, del estado de salud y las condiciones de las aves. La higiene y el manejo son también importantes en el período de post vacunación.

La reacción después de la vacunación primaria es muy suave. Podrían existir signos respiratorios muy leves que pueden ocurrir al 4 –7 días postvacunación.

Esos síntomas usualmente desaparecerán después de 2 semanas. La revacunación normalmente no causa ninguna reacción cuando se siguen las indicaciones del prospecto adjunto.

La inmunidad puede darse en una semana post vacunación y alcanza su grado óptimo en unas pocas semanas.

Una vacunación de emergencia en gallinas ponedoras no inmunizadas puede provocar una caída en su producción de huevos, que usualmente se restaura.

Período de retiro: Ninguno

Precauciones

- . Lavar y desinfectar las manos y el equipo antes de vacunar. Cualquier sobrante de la vacuna deberá ser desechado o incinerado.
- Evitar exponer el virus vacunal.
- . Vacunar solamente animales sanos.
- . Cada vial deberá ser usado inmediatamente después de ser abierto.
- El virus vacunal de Newcastle podría producir algunos casos de conjuntivitis, manipular con cuidado los frascos.

Condiciones de almacenamiento

Almacenar en un lugar oscuro a 2° – 8° C.

Presentación

Frasco de 1 000, 2,500 y 5,000 dosis

Intervet S.A.
Av. Circunvalación del Club Golf
Los Incas 134, Torre 2, Of.1901
Santiago de Surco, Lima Perú
T +51 1 411 5100
www.msd-animal-health.com.pe



FABRICADO POR:

Intervet International B.V. Boxmeer - Holanda

Importado por:

Intervet S.A.

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Of.1901

Santiago de Surco, Lima Perú

Bajo Licencia de Intervet International B.V.,

Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta médica.

USO VETERINARIO

Registro SENASA: B.01.1.01.I.375