



NOBILIS REO+IB+G+ND

Ficha técnica

Vacuna inactivada emulsionada en adyuvante oleoso para su uso en reproductoras en crecimiento contra la enfermedad infecciosa de la Bursa (EIB), Enfermedad de Newcastle (ND) Bronquitis Infecciosa (IB) y las enfermedades causadas por Reovirus.

Composición

Cada dosis de 0,5 ml contiene:

Componentes activos:

Gumboro, cepa estándar
Newcastle cepa Clone 30

Induciendo 14.5 log₂ VN unidades/dosis
Induciendo ≥ 4 log₂ HI unidades por
1/50ava de una dosis o conteniendo
≥ PD50 unidades/dosis

Bronquitis cepa Mass
Reovirus cepa 1733
Reovirus cepa 2408

Induciendo ≥ 6 log₂ HI unidades/dosis
Induciendo ≥ 7.4 log₂ HI unidades/dosis
Induciendo ≥ 7.4 log₂ HI unidades/dosis

Forma farmacéutica:

Emulsión inyectable (agua en aceite).

Indicaciones

La vacuna está recomendada para la vacunación de memoria de reproductoras con el fin de protegerlas frente al serotipo Massachusetts de la bronquitis infecciosa y a la enfermedad de Newcastle e inmunizarlas contra la infección con Reovirus y virus de la enfermedad de Gumboro, para proteger a su descendencia frente a las infecciones con Reovirus y a la enfermedad de Gumboro durante las primeras semanas de vida mediante los anticuerpos maternos.

En las áreas donde los serotipos variantes del IBV no estén presentes, se puede utilizar una vacuna Nobilis con sólo la cepa del serotipo Massachusetts como componente del IBV. En las áreas donde se sabe que los serotipos variantes del IBV son predominantes, deberá utilizarse una vacuna Nobilis que incluya las cepas variantes

Intervet S.A.

Av. Circunvalación del Club Golf
Los Incas 134, Torre 2, Of. 1901
Santiago de Surco – Lima Perú
T +51 1 411 5100

www.msd-animal-health.com.pe



Dosis y Vía de Administración

Inyección por vía intramuscular en el muslo o la pechuga o vía subcutánea en la parte posterior del cuello con una dosis de 0,5 ml por ave.

Tiempo de retiro

No requiere

Almacenamiento:

Almacenar en refrigeración entre 2-7°C. NO CONGELAR - Protéjase de la luz.

Precauciones

NOBILIS REO+IB+G+ND, debe ser administrada a aves de aproximadamente 14-20 semanas de edad, pero no durante las 4 semanas previas a la fecha prevista para el comienzo de la puesta.

En el caso de que se utilicen previamente vacunas vivas para la primovacunación de las aves frente a Bronquitis Infecciosa, Enfermedad de Newcastle, Enfermedad de Gumboro y reovirus aviar; Nobilis REO+ IB+G+ND, debe administrarse al menos 4 semanas después de la administración de las vacunas vivas.

Antes de usar permitir que la vacuna alcance la temperatura ambiente (20-25°C). Agitar bien la botella antes de usar.

Presentación

Frascos de 500 ml suficientes para 1.000 dosis.

Fabricado por:

Intervet International B.V.

Boxmeer - Holanda

Intervet S.A.

Av. Circunvalación del Club Golf
Los Incas 134, Torre 2, Of. 1901
Santiago de Surco – Lima Perú
T +51 1 411 5100

www.msd-animal-health.com.pe



Importado por:

Intervet S.A.

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Of. 1901

Santiago de Surco – Lima Perú

Bajo Licencia de Intervet International B.V.,

Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta médica.

USO VETERINARIO

Registro SENASA: B.01.201.I.1244