



# NOBILIS RT+IBMULTI+ND+EDS

## Ficha técnica

Contiene dos cepas inmunogénicas del virus de la Bronquitis Infecciosa (serotipo *Massachussets* y una cepa variante perteneciente al serotipo D274), una cepa inmunogénica del virus de la Rinotraqueítis aviar, virus de la enfermedad de Newcastle y del virus del Síndrome de baja postura 76.

---

### Composición

#### Ingredientes Activos

(por dosis como fue medido en la prueba respectiva de potencia)

IBV cepa M41	:	induciendo	≥ 4.0 log <sub>2</sub> unidades VN*
IBV cepa 249g	:	induciendo	≥ 4.0 log <sub>2</sub> unidades VN*
TRT cepa BUT 1#8544:		induciendo	≥ 9.5 log <sub>2</sub> ELISA unidades.
EDS 76 cepa BC14:		induciendo	≥ 6.5 log <sub>2</sub> unidades HI**
NDV Cepa Clone 30		induciendo	≥ 4.0 log <sub>2</sub> unidades HI** por 1/50 dosis o conteniendo ≥ 50 PD <sub>50</sub> *** unidades
Excipientes c.s.p			1 dosis (0.5ml)

\*VN: Virus neutralización, \*\*HI: Hemaglutinación inhibida

\*\*PD<sub>50</sub>: Dosis protectiva media

### Formulación:

Emulsión para inyección (Agua en aceite).

### Indicaciones para el uso

Vacunación de pollitas de reemplazo contra la enfermedad causada por los virus de Bronquitis Infecciosa serotipo Massachusetts y variantes; virus de la Rinotraqueítis aviar, virus de la enfermedad de Newcastle y virus del Síndrome de baja de postura.



## **Edad de vacunación**

Debe administrar a aves de alrededor 14-20 semanas de edad, pero no menos de cuatro semanas antes del período esperado de postura.

Para un efecto óptimo de reforzamiento, las aves deben ser preparadas con vacunas activas contra la Bronquitis Infecciosa Y Enfermedad de Newcastle.

## **Vía de administración**

Inyección de 0,5 vía intramuscular en los músculos de la pierna o en el pecho o subcutánea en la parte baja del cuello.

## **Almacenamiento**

Almacenar entre +2 y +8° C. No congelar. Proteger de la luz solar.

## **Precauciones especiales**

- Vacunar sólo animales sanos
- Antes de usar la vacuna permita que alcance la temperatura ambiente (15° - 25° C)
- Agitar bien el frasco antes de usar
- Usar equipo de inyección esterilizado
- Usar el contenido completo una vez abierta la botella
- No mezclar con otras vacunas
- Puede ocurrir una reacción local si accidentalmente el vacunador se inyecta a sí mismo o a algún espectador. Se recomienda buscar la ayuda de un médico inmediatamente, teniendo cuidado de informarle que la vacuna es una emulsión de agua-en-aceite.

## **Presentación**

Frascos PET conteniendo 500 ml suficientes para 1000 dosis

## **Precauciones para la disposición del producto no usado o material de desecho**

No se requiere ninguna precaución especial.  
Descartar el producto por los canales apropiados.

**Intervet S.A.**  
Av. Circunvalación del Club Golf  
Los Incas 134, Torre 2, Of.1901  
Santiago de Surco, Lima Perú  
T +51 1 411 5100  
[www.msd-animal-health.com.pe](http://www.msd-animal-health.com.pe)



**Fabricado por:**

Intervet International B.V. - Boxmeer – Holanda

**Importado por:**

**Intervet S.A.**

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Of.1901  
Santiago de Surco, Lima Perú

Bajo Licencia de Intervet International B.V.

Mantener fuera del alcance de los niños

Venta bajo receta médica

**Solo para Uso Veterinario**

**Registro SENASA: B.01.2.01.I.0949**