



OXITRAT L.A. PLUS

Ficha técnica.

ANTIBIÓTICO INYECTABLE DE ACCIÓN PROLONGADA Y AMPLIO ESPECTRO, ASOCIADO A UN ANTIINFLAMATORIO NO HORMONAL. OXITRAT LA PLUS es una solución inyectable de oxitetraciclina, asociado al diclofenaco sódico, una sustancia no hormonal, con actividad antiinflamatoria, analgésica y antipirética.

Composición:

Cada 100 mL contiene:

| | |
|-------------------------------|----------|
| Oxitetraciclina (clorhidrato) | 20,0 g |
| Diclofenaco sódico | 1,0 g |
| Vehículo c.s.p. | 100,0 mL |

Indicaciones

OXITRAT LA PLUS se indica para el combate contra las infecciones causadas por bacterias Grampositivo y Gramnegativo susceptibles a la oxitetraciclina y para el tratamiento de anaplasmosis en bovinos.

Administración vía intramuscular indicada para:

Podredumbre del Casco (*Fusobacterium necrophorum*)
Difteria (*Fusobacterium necrophorum*)
Mastitis (*Staphylococcus aureus*)
Metritis (*Staphylococcus aureus*)
Artritis infecciosa (*Staphylococcus aureus*)
Heridas infecciosas (*Staphylococcus aureus*)
Enterotoxemia (*Clostridium perfringens*)
Anaplasmosis (*Anaplasma marginale*)

Administración vía intravenosa indicada para:

Neumonía e infecciones respiratorias (*Bordetella bronchiseptica*)
Enteritis (Diarreas) (*Escherichia coli*)
Podredumbre del Casco (*Fusobacterium necrophorum*)
Difteria (*Fusobacterium necrophorum*)
Mastitis (*Staphylococcus aureus*, *Enterobacter aerogenes*, *Escherichia coli*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus uberis*)
Metritis (*Staphylococcus aureus*; *Escherichia coli*)



Artritis infecciosa (*Staphylococcus aureus*; *Escherichia coli*)
Heridas Infecciosas (*Staphylococcus aureus*; *Escherichia coli*)
Enterotoxemia (*Clostridium perfringens*)
Anaplasmosis (*Anaplasma marginale*)

Dosis y Vía de Administración.

Vía Intramuscular: La dosificación recomendada es de 1,0 mL/10 kg de peso corporal, que corresponde a 20 mg de oxitetraciclina/kg de peso y 1,0 mg de diclofenaco sódico/kg de peso para bovinos.

Vía Intravenosa: La dosificación recomendada es de 1,0 mL/20 kg de peso corporal, que corresponde a 10 mg de oxitetraciclina/kg de peso y 0,5 mg de diclofenaco sódico/kg de peso para bovinos.

Intervalo entre las dosificaciones:

Vía Intramuscular: normalmente, una dosis es suficiente para un tratamiento efectivo, pero en infecciones graves, una segunda dosis debe administrarse 3 días tras la primera aplicación.

Vía Intravenosa: administrar una segunda dosis 24 horas tras la primera aplicación y nuevamente en hasta 4 días consecutivos.

Volumen máximo recomendado por punto de aplicación: 10 mL

Las dosis superiores a las indicadas, administradas por vía intramuscular, se deben subdividir en dos o más puntos de aplicación.

Las subdosificaciones pueden facilitar el desarrollo de la resistencia e interferir en la eficacia del tratamiento.

Precauciones:

- Un posible oscurecimiento de la solución puede ocurrir, y esto no implica la pérdida de la calidad terapéutica del producto;
- No se debe administrar a animales con historial de hipersensibilidad a las tetraciclinas y/o que tengan alteraciones hepáticas o renales;
- Tras la apertura del frasco, el producto debe consumirse en un máximo de 10 días y deben descartarse las eventuales sobras.

Periodo de retiro

Bovinos: sacrificio – 39 días si se aplica por las vías intravenosa e intramuscular;
Leche - 07 días si se aplica por la vía intravenosa y 19 días si se aplica por la vía intramuscular.



Contraindicaciones

- No se indica para uso en equinos, perros y gatos;
- Aunque el antibiótico sea bien tolerado, se pueden observar pequeñas reacciones locales (leve edema) de naturaleza transitoria.

Presentaciones

Frascos conteniendo 50 y 100 mL.

Almacenamiento:

Mantener protegido de la luz y a una temperatura inferior de 25 °C.

FABRICADO POR:

VALLÉE S/A – BRASIL

Montes Claros – Minas Gerais – Brasil.

IMPORTADO POR:

Intervet S.A.

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, OF. 1901 Santiago de Surco. Lima - Perú.

Bajo Licencia de Intervet International B.V.,

Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta médica.

USO VETERINARIO

Registro SENASA: F.F6.01.I.0016