



# PENCIVET SUPER FUERTE®

## Ficha técnica.

Antimicrobiano inyectable de amplio espectro y de larga acción a base de penicilina G Benzatínica, Penicilina G Procaínica, Penicilina G Potásica y Sulfato de Estreptomicina asociado a un antiinflamatorio no esterooidal Diclofenaco de sódico. Está indicado para procesos infecciosos primarios y secundarios, causados por gérmenes sensibles a la Penicilina y Estreptomicina

### Composición

Penicilina G Benzatínica	3,000,000 U. I
Penicilina G Procaínica	1,500,000 U.I.
Penicilina G Potásica	1,500,000 U.I.
Sulfato de estreptomicina	2,500 mg
Diluyente:	
Diclofenaco de sodio	225 mg
Vehículo c.s.p.	15 ml

### Indicaciones

Infecciones localizadas o sistémicas causadas por microorganismos Gram positivos y Gram negativos sensibles a la combinación de penicilina – estreptomicina, que además cursen con una inflamación aguda o crónica del tejido afectado.

**Bovinos:** Diarreas y neumonías en becerros, enteritis y septicemias producidas por *Salmonella spp.* Pododermatitis, mastitis, metritis, pielonefritis, leptospirosis, ántrax. Carbunco sintomático, septicemia hemorrágica, infecciones, postquirúrgicas.

**Equinos:** Gurma o papera, enteritis, neumonías y otras infecciones respiratorias, clostridiasis, metritis, mastitis, leptospirosis, etc.

**Porcinos:** Pasteurolosis, y otras neumonías, metritis mastitis, salmonelosis, y otras enteritis, infecciones postquirúrgicas, etc.

**Ovinos y caprinos:** Pododermatitis, mastitis metritis, neumonías, listeriosis, infecciones postquirúrgicas



### **Dosis y Vía de Administración**

El frasco reconstituido alcanza para un animal de 600 kilos de peso vivo o dos animales de 300 Kg. de peso vivo

Se puede aplicar 1 ml para 30-40 Kg. de peso vivo

Si es necesario repetir la dosis, a partir de las 96 horas

### **Precauciones**

No se recomienda la aplicación endovenosa

No se debe utilizar otro antiinflamatorio asociado a Pencivet Super Fuerte

Si la dosis excede a 20 ml debe administrarse en otro sitio

### **Almacenamiento:**

Almacenar a  $\leq 25$  °C.

### **Período de Retiro**

Carne = 30 días

Leche = 72 horas

### **Presentación**

Caja con un frasco de 8.4 g de polvo liofilizado y un frasco diluyente de 15 ml (diclofenaco de sodio)

### **FABRICADO POR:**

Intervet International S.R.L. – Aprilia - Italia.

### **IMPORTADO POR:**

#### **Intervet S.A.**

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Of. 1901,

Santiago de Surco, Lima - Perú

Bajo Licencia de Intervet International B.V.,

Mantener fuera del alcance de los niños. Venta bajo receta médica.

### **USO VETERINARIO**

**Registro SENASA: F.03.01.I.0517**

---