



RESFLOR

Ficha técnica

Solución inyectable antibiótica.

Composición

Contiene:

Florfenicol	300.0 mg
Flunixin (como meglumina)	16.5 mg
Excipientes c.s.p.	1 mL.

Especies

Bovinos

Indicaciones

En bovinos para el tratamiento de enfermedades respiratorias y su pirexia asociada, causadas por *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Histophilus somni* y *Mycoplasma bovis*.

Dosis y vía de administración

Para inyección subcutánea 40 mg/kg de Florfenicol y 2.2 mg/kg flunixin (equivalente a 2 ml de solución/15 kg peso vivo) para ser administrado en una sola inyección por vía subcutánea. El volumen de la dosis aplicada en un solo lugar de inyección no debe exceder 10 ml. La inyección solo debe ser aplicada en el cuello.

Advertencia para una correcta administración.

Desinfectar el tapón del frasco antes de extraer cada dosis.
Use jeringas y agujas secas y estériles.

Contraindicaciones

No utilizar en toros adultos destinados a la reproducción.
No utilizar en animales productores de leche para el consumo humano.
No utilizar en animales que sufren de enfermedades renales o hepáticas.
No lo utilice si existe el riesgo de sangrado gastrointestinal o en los casos en que existen pruebas de la hemostasia alterada.



Reacciones adversas

La administración subcutánea del producto puede provocar una inflamación en el sitio de aplicación, que se vuelve palpable de 2 a 3 días después de la inyección. La inflamación provocada por la inyección puede durar de 15 a 36 días después de la aplicación.

Macroscópicamente esto se asocia con una leve irritación de la hipodermis. La extensión al músculo subyacente se observó sólo en unos pocos casos. Después de 56 días post-aplicación no se observaron algún decomiso al momento del sacrificio. Si observa cualquier efecto de gravedad o no mencionado en este prospecto, consulte con su Médico Veterinario

Tiempo de retiro

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 46 días después de finalizado el tratamiento. No utilizar en animales en lactación cuya leche se utiliza para consumo humano ni en los 2 meses antes del parto.

Presentación

Frascos de 100 ml.

Condiciones de almacenamiento

Almacenar a temperatura ambiente no superior a 25°C.
Periodo de caducidad después de abierto el frasco: 28 días.

FABRICADO POR:

Vet Pharma Friesoythe GmbH, Alemania.

Intervet S.A.
Av. Circunvalación del Club Golf
Los Incas 134, Torre 2, Of. 1901,
Santiago de Surco, Lima - Perú
T +51 1 411 5100
www.msd-animal-health.com.pe



IMPORTADO POR:

Intervet S.A.

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Of. 1901,

Santiago de Surco, Lima - Perú

Bajo Licencia de Intervet International B.V.

USO VETERINARIO

Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta médica.

Registro SENASA: F.71.01.I.0077