



ZUPREVO

Ficha técnica

Antibacteriano en solución inyectable para ganado vacuno a base de Tildipirosina.

Composición

Sustancia activa:

Tildipirosina	180 mg
Excipientes c.s.p.	1 ml

Especies de destino

Bovinos

Indicaciones

Para el tratamiento y prevención del Complejo Respiratorio Bovino (CRB) asociado con *Manheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* e *Histophilus somni* sensibles a la Tildipirosina.

La presencia de la enfermedad en el ganado debe ser confirmada antes del tratamiento preventivo.

Dosis y vía de administración

Administrar 4 mg de Tildipirosina por kg de peso vivo (equivalente a 1 ml / 45 kg peso vivo) una sola vez por la vía subcutánea.

Advertencias para la correcta administración

- Para el tratamiento de animales de más de 450 kg de peso, divida la dosis de tal forma que no se apliquen más 10 ml en un solo sitio.
- El tapón de goma del vial puede ser perforado con seguridad hasta 20 veces. De lo contrario, se recomienda el uso de una jeringa de dosis múltiples.
- Para garantizar la correcta dosificación y evitar la sobredosificación, el peso corporal se debe determinar con la mayor precisión posible.



- Se recomienda tratar a los animales en las etapas tempranas de la enfermedad y evaluar la respuesta al tratamiento dentro de los primeros 2 a 3 días después de la inyección. Si los signos clínicos del complejo respiratorio persisten o aumentan, el tratamiento debe ser cambiado usando otro antibiótico y continuar hasta que los signos clínicos se hayan resuelto.

Contraindicaciones

No usar en caso de hipersensibilidad a los antibióticos macrólidos, al ácido cítrico monohidratado o al propilenglicol.

Reacciones adversas

Dolor a la inyección e inflamación en el sitio de aplicación son muy comunes en los animales tratados.

Tras la inyección del máximo volumen recomendado de 10 ml, la inflamación en el sitio de aplicación puede estar asociada con dolor a la palpación durante aproximadamente un día en algunos animales tratados.

La inflamación es transitoria y generalmente se resuelve en un plazo de 7 a 16 días, en algunos animales la inflamación puede persistir hasta 21 días.

Las reacciones patomorfológicas a la inyección se resolverán en gran parte dentro de un periodo de 35 días.

Si usted nota cualquier otro efecto de gravedad u otro tipo de efecto no mencionado en este prospecto, por favor informe a su Médico Veterinario.

Advertencias especiales.

Precauciones para su uso en animales:

- Puede haber resistencia cruzada con otros macrólidos.
- No administrar con antimicrobianos con un modo de acción similar tales como otros macrólidos o lincosamidas.
- Siempre que sea posible el medicamento veterinario debe ser utilizado únicamente en base a pruebas de sensibilidad.
- La seguridad del medicamento veterinario no se ha establecido durante el embarazo o la lactancia del ganado. Sin embargo, no hubo evidencia de efectos selectivos del desarrollo o la reproducción en ninguno de los estudios de laboratorio.
- Utilice únicamente de acuerdo con la evaluación beneficio / riesgo efectuada por el veterinario responsable.



- La sobredosis de 10 veces la dosis recomendada, así como la administración subcutánea repetida del medicamento veterinario sólo resultó en signos clínicos transitorios atribuidos a molestias en el lugar de la inyección e hinchazón en el sitio de aplicación asociada con dolor en algunos animales.
- En ausencia de estudios de compatibilidad, este producto veterinario no debe ser mezclado con otros productos médicos veterinarios.

Precauciones para la persona que administra el producto

- Se debe tener especial cuidado para evitar la auto-inyección. En caso de auto-inyección accidental busque ayuda médica inmediatamente y muéstrele este prospecto o la etiqueta al Médico.
- No utilizar jeringas automáticas que no cuenten con un sistema de protección adicional.
- La Tildipirosina puede causar sensibilización al contacto con la piel. Si ocurre exposición accidental, lave la piel inmediatamente con agua y con jabón.
- Si accidentalmente entra en contacto con los ojos, enjuague los ojos con agua limpia.
- Lávese las manos después de usar.
- Cualquier producto no utilizado o material de desecho derivado del uso de este producto veterinario se debe desechar de acuerdo con la regulación local.

Período de retiro.

Bovinos (Carne y vísceras): 47 días

No utilice en ganado lechero que esté produciendo leche para consumo humano.

No utilizar en novillas o vacas gestantes dentro de los dos meses anteriores a la fecha prevista de parto, cuando la leche producida esté destinada para consumo humano.

Almacenamiento

No almacenar a temperaturas mayores a 25 °C.

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el vial.

Caducidad del producto una vez abierto el vial: 28 días.

Presentación

Frasco de: 50 ml y 100 ml

Intervet S.A.
Av. Circunvalación del Club Golf
Los Incas 134, Torre 2, Of. 1901,
Santiago de Surco, Lima - Perú
T +51 1 411 5100
www.msd-animal-health.com.pe



FABRICADO POR:

Intervet International GmbH – Alemania.

IMPORTADO POR:

Intervet S.A.

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Of. 1901,

Santiago de Surco, Lima - Perú

Bajo Licencia de Intervet International B.V.,

Mantener fuera del alcance de los niños.

USO VETERINARIO

Venta bajo receta médica.

Registro SENASA: F.03.01.I.1688