



BRAVECTO Spot On (Pipetas) Perros.

Ficha técnica

Para el tratamiento de infestaciones por garrapatas, pulgas y ácaros en perros

Fórmula

Fluralaner.....280 mg

Excipientes c.s.p.....1ml

Cada pipeta contiene:

	Contenido de la pipeta (ml)	Fluralaner (mg)
Para perros muy pequeños 2 – 4.5 kg	0.4	112.5
Para perros pequeños > 4.5 – 10 kg	0.89	250
Para perros medianos > 10 – 20 kg	1.79	500
Para perros grandes > 20 – 40 kg	3.57	1000
Para perros muy grandes > 40 – 56 kg	5.00	1400

Solución translúcida de incolora a amarilla

Indicaciones

Para el tratamiento de infestaciones por garrapatas y pulgas en perros.

- Este medicamento de uso veterinario es un insecticida y acaricida sistémico que proporciona:

actividad inmediata y persistente durante 12 semanas para matar pulgas (*Ctenocephalides felis* y *C. canis*),

- actividad inmediata y persistente durante 12 semanas para matar garrapatas (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor reticulatus*, *Ixodes scapularis*, *I. hexagonus*, y *Haemaphysalis elliptica*).

Las pulgas y garrapatas deben adherirse al hospedador y comenzar a alimentarse para exponerse a la sustancia activa. El efecto comenzará en las 8 horas siguientes para las pulgas (*C. felis*) y en 12 horas para las garrapatas (*I. ricinus*).

El producto controla eficazmente las poblaciones de pulgas en las áreas a donde los perros tratados tienen acceso. El producto puede utilizarse como parte de una estrategia de tratamiento para el control de la dermatitis alérgica a la picadura de pulga (DAPP).



El producto previene la transmisión de *Babesia canis* en los perros.
Un solo tratamiento previene la transmisión de *Dipilidium caninum* de pulgas infectadas a perros susceptibles por 12 semanas.
Para el tratamiento de la Demodicosis causada por el ácaro *Demodex spp.*; tratamiento de infestaciones del ácaro del oído (*Otodectes cynotis*) y para el tratamiento de la sarna sarcóptica producida por *Sarcoptes scabiei*.

Contraindicaciones

No utilizar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a cualquiera de los excipientes.

Reacciones adversas

En los estudios clínicos se observaron casos esporádicos (1.2% de los perros tratados) de reacciones leves y temporales en la piel, tal como eritema y alopecia en la zona de aplicación.

Si usted observa algún efecto grave u otros efectos no mencionados en este prospecto, por favor informe a su médico veterinario.

Especies de destino

Perros.

Dosis y vías de administración.

Para uso tópico.

Bravecto debe administrarse de acuerdo con la siguiente tabla (correspondiente a una dosis de 25-56 mg de Fluralaner/kg de peso):


Peso del perro (kg)	Concentración y número de pipetas a ser administradas				
	Bravecto 112.5 mg	Bravecto 250 mg	Bravecto 500 mg	Bravecto 1000 mg	Bravecto 1400 mg
2 – 4.5	1				
>4.5 – 10		1			
>10 – 20			1		
>20 – 40				1	
>40 – 56					1

Para perros de más de 56 kg de peso, utilice una combinación de dos pipetas que se ajuste lo más posible al peso del animal.

Consejos para la administración correcta

Método de administración:


Paso 1: Inmediatamente antes de usar, abra el sobre de plástico y saque la pipeta. Ésta debe sostenerse en posición vertical (la punta hacia arriba) por la base o por la parte rígida superior por debajo de la tapa. La tapa debe rotarse completamente en el sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario a éstas. La tapa se mantendrá adherida a la pipeta; no es posible desprenderla. La pipeta estará abierta y lista para usarse cuando sienta que el sello se ha roto.



Paso 2: Durante la aplicación, el perro debe permanecer de pie o estar echado con la espalda colocada horizontalmente.

Coloque la punta de la pipeta verticalmente contra la piel entre las escápulas del perro.

Paso 3: Presione suavemente la pipeta y aplique todo el contenido de la solución sobre la piel del perro en uno (cuando el volumen es pequeño) o varios puntos a lo largo del lomo desde los hombros hasta la base de la cola. Evite la aplicación de una cantidad excesiva de la solución en un solo punto, ya que esto puede provocar que la solución escurra o gotee fuera de la piel del perro.





Esquema de tratamiento:

Para el mejor control de la infestación por garrapatas o pulgas, el producto debe administrarse a intervalos de 12 semanas.

Periodo de espera

No aplica.

Precauciones especiales de almacenamiento

Manténgase fuera de la vista y el alcance de los niños.

Almacenar entre 15 - 30°C.

Las pipetas deben conservarse dentro del sobre de plástico para evitar la pérdida del solvente o la absorción de humedad. Los sobres de plástico deben abrirse justo antes de ser utilizados.

Advertencias especiales

Advertencias especiales para cada una de las especies de destino:

El riesgo de transmisión de enfermedades provocadas por parásitos se reduce substancialmente debido al rápido inicio de la acción acaricida e insecticida. Los parásitos deben iniciar la alimentación en el hospedador para estar expuestos a Fluralaner; por lo tanto, no debe excluirse el riesgo de transmisión de enfermedades provocadas por parásitos si las condiciones no son favorables.

Precauciones especiales para uso en animales:

Se debe tener cuidado para evitar el contacto del producto con los ojos del animal.

No se aplique directamente sobre lesiones de la piel.

No bañe o permita que el perro se sumerja en el agua o nade en arroyos o estanques durante 3 días después del tratamiento.

A falta de datos disponibles, este producto médico de uso veterinario no debe utilizarse en cachorros de menos de 8 semanas de edad y/o perros que pesen menos de 2 kg.

El producto no debe administrarse a intervalos menores a 8 semanas, ya que la seguridad de su aplicación a intervalos más cortos no ha sido probada.

Precauciones especiales que debe tomar la persona que administre el medicamento de uso veterinario a los animales:

Mantenga el producto en su empaque original hasta el momento de su uso para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo.

Una pipeta usada debe descartarse de inmediato.



Este producto, así como la piel humedecida de un animal recién tratado pueden ser ligeramente irritantes para la piel y/o los ojos. Evite el contacto con la piel y/o los ojos, incluyendo el contacto de manos a ojos.

No comer, beber ni fumar mientras se esté manipulando el producto.

Inmediatamente después de utilizar el producto lavarse cuidadosamente con agua y jabón las manos y la piel que han estado en contacto con el mismo.

En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua.

En caso de ingestión accidental, consulte de inmediato con un médico y muéstrelle el prospecto del empaque o la etiqueta del producto.

No toque ni permita que los niños toquen el lugar de aplicación hasta que esté seco.

El producto es altamente inflamable. Manténgase alejado del calor, chispas, flamas abiertas u otras fuentes de combustión.

Gestación, lactancia o fertilidad:

El producto puede utilizarse en hembras reproductoras, gestantes y lactantes.

Interacción con otros productos médicos y otras formas de interacción:

Ninguna conocida.

Fluralaner se encuentra altamente unido a proteínas plasmáticas y podría competir con otros medicamentos de alta afinidad a proteínas tales como antiinflamatorios no esteroides (AINES) y la Warfarina derivada de la cumarina. La incubación de Fluralaner en presencia de carprofeno o Warfarina

en el plasma del perro a concentraciones plasmáticas máximas esperadas no reduce la unión a proteínas de Fluralaner, carprofeno o Warfarina.

Durante las pruebas de laboratorio y las pruebas clínicas en campo, no se observaron interacciones entre Bravecto solución tópica para perros y los medicamentos de uso veterinario generalmente utilizados.

Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia, antídotos):

Se demostró la seguridad del producto en cachorros de 8–9 semanas de edad y con un peso de entre 2.0 y 3.7 kg tratados en tres ocasiones a intervalos más cortos que los recomendados con sobredosis hasta 5 veces mayores que la dosis máxima indicada (intervalos de 8 semanas).

Se demostró la seguridad en hembras reproductoras, gestantes y lactantes tratadas con sobredosis hasta 5 veces mayores a la dosis indicada.

Este producto médico de uso veterinario fue bien tolerado en Collies con deficiencia de la proteína 1 de resistencia a múltiples medicamentos (MDR1 -/-) después de la administración única por vía oral de una dosis 3 veces mayor a la dosis máxima recomendada.

Incompatibilidades:

Se desconocen.

Intervet S.A.
Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Oficina 1901.
Santiago de Surco, Lima - Perú
T +51 1 411 5100
F +51 1 221 6873
www.msd-animal-health.com.pe



Precauciones especiales para descartar el producto no utilizado o los materiales de desecho.

Los medicamentos no deben descartarse vertiéndolos en aguas residuales o en la basura doméstica.

Pregunte a su médico veterinario cómo debe eliminar los medicamentos que ya no se necesitan. Estas medidas tienen como objetivo proteger el medio ambiente.

FABRICADO POR:

Patheon Manufacturing LLC Services. Carolina del Norte- USA.

PRODUCTO DE:

Intervet, Inc. (dba. Merck Animal Health) 2 Giralda Farms Madison, NJ 07940, USA

IMPORTADO POR:

Intervet S.A.

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Oficina 1901.
Urb. Club Golf Los Incas, Santiago de Surco, Lima. - Perú.

Bajo Licencia de Intervet International B.V.,
Mantener fuera del alcance de los niños.
Venta bajo receta médica.

USO VETERINARIO

Registro SENASA:

Bravecto Spot On 112.5 mg	F.87.33.I.0255
Bravecto Spot On 250 mg	F.87.33.I.0252
Bravecto Spot On 500 mg	F.87.33.I.0256
Bravecto Spot On 1000 mg	F.87.33.I.0253
Bravecto Spot On 1400 mg	F.87.33.I.0254