



CIRCUMVENT PCV M

Ficha técnica

Emulsión inyectable.

Descripción

Es una vacuna subunitaria inactivada con adyuvante que contiene la proteína ORF2 del Circovirus porcino tipo 2 y células enteras inactivadas de *Mycoplasma hyopneumoniae* como ingrediente activo, es una emulsión agua en aceite para estimular una respuesta inmunológica prolongada.

Composición

Sustancia activa

Antígeno Subunitario ORF2 PCV2. ≥ 1.3 .R.P.

Mycoplasma hyopneumoniae ≥ 1.3 . R.P

Excipiente c.s.p 2 ml.

R.P. Potencia relativa

Indicaciones de uso

La vacuna se recomienda para uso en cerdos saludables, como ayuda en la prevención de la viremia y en la prevención de la excreción del virus causado por el Circovirus porcino y reducir las lesiones pulmonares debidas a la infección causada por el *Mycoplasma hyopneumoniae*.

El uso de la vacuna resulta en una reducción de la mortalidad y en la pérdida de peso durante el acabado.

Siguiendo el programa de vacunación recomendado, el comienzo de la inmunidad es de 2 semanas luego de la última vacunación para el componente PCV2 y 3 semanas para el componente *Mycoplasma hyopneumoniae*. La duración de la inmunidad cubre el periodo de acabado.

Dosis y vía de administración y modo de empleo

La vacuna se administra a cerdos de 3 semanas de edad o mayores a través de una inyección intramuscular en dosis de 2 ml, seguida de un refuerzo 3 semanas después



Advertencia y recomendaciones:

Puede presentarse reacciones leves en el sitio de la inyección.

Si se presentan reacciones anafilácticas, tratar con epinefrina.

Usar solo en animales sanos.

No usar en hembras gestantes ni durante la lactancia

No usar en forma concomitante con otros medicamentos.

Agitar bien antes de usar y dejar que la vacuna alcance la temperatura de 20 – 25°C antes de su aplicación.

Efectos adversos

Un aumento transitorio de la temperatura corporal puede ocurrir hasta 2 días después de la vacunación. Algunos lechones pueden estar deprimidos y presentar un menor consumo de alimento por algunos días.

Una reacción local transitoria en el sitio de inyección puede ser observada.

Puede ocurrir una reacción de hipersensibilidad, los animales se recuperarán en los minutos siguientes sin necesidad de tratamiento alguno.

Condiciones de almacenamiento

Almacenar a una temperatura entre 2 a 8°C. No congelar.

Proteger de la luz.

Periodo de retiro:

No tiene (0 días)

Precauciones especiales para el operador:

Para el usuario:

Este producto contiene aceite mineral. Una inyección accidental o auto inyección accidental pueden resultar en dolor severo e inflamación, especialmente si se inyecta en una articulación a un dedo, y en casos raros, puede resultar en la pérdida del dedo afectado si no acude a atención médica de inmediato.

Si usted es inyectado accidentalmente con este producto, busque atención médica de inmediato, aunque sólo sea una pequeña cantidad inyectada y lleve el inserto interno con usted.

Si el dolor persiste por más de 12 horas luego del examen médico, busque atención médica otra vez.



Para el médico:

Este producto contiene aceite mineral. Aunque se hayan inyectado pequeñas cantidades, una inyección accidental con este producto puede causar una inflamación intensa, que puede resultar, por ejemplo, en necrosis isquémica e incluso la pérdida de un dedo. Se requiere atención quirúrgica experta de inmediato y se podría necesitar de una incisión temprana e irrigación del área inyectada, especialmente donde se involucra la pulpa o tendón de los dedos.

Advertencias:

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

Presentaciones:

Frasco vial x 100 ml – 50 dosis y 500 ml – 250 dosis.

FABRICADO POR:

Intervet Inc. USA

IMPORTADO POR:

Intervet S.A.

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Ofi. 1901

Santiago de Surco, Lima - Perú

Bajo Licencia de Intervet International B.V.,

Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta médica.

USO VETERINARIO

Registro SENASA: B.01.A.05.I.1246