



# NOBIVAC® DAPPv+L4

## Ficha técnica

### DESCRIPCIÓN

La vacuna **Nobivac® DAPPv+L4** es una vacuna combinada que reúne los beneficios de la vacuna Nobivac® DAPPv viva modificada y una bacteria Nobivac® Lepto4.

### Composición:

*Contenido por dosis:*

Virus de moquillo canino, cepa Distemperoide	≥ 10 <sup>3.7</sup> TCID <sub>50</sub>
Adenovirus canino tipo 2, cepa Ditchfield	≥ 10 <sup>4.8</sup> TCID <sub>50</sub>
Virus de Parainfluenza canina, cepa CPI-PR	≥ 10 <sup>4.3</sup> TCID <sub>50</sub>
Parvovirus canino, cepa SAH-CPV-2b	≥ 10 <sup>5.1</sup> FAID <sub>50</sub>
Bacterina <i>Leptospira canicola</i> , cepa LC-NY	≥ 80 hámster PD <sub>80</sub>
Bacterina <i>Leptospira icterohaemorrhagiae</i> , cepa LI-11403 J	≥ 80 hámster PD <sub>80</sub>
Bacterina <i>Leptospira grippotyphosa</i>	≥ 80 hámster PD <sub>80</sub>
Bacterina <i>Leptospira pomona</i>	≥ 80 hámster PD <sub>80</sub>
Excipientes c.s.p.	1 ml

### INDICACIONES

La vacuna **Nobivac® DAPPv** es una vacuna de virus vivos modificada que es recomendada para la vacunación de perros sanos como ayuda en la prevención de la enfermedad causada por el virus del Moquillo canino, Adenovirus canino tipo 1 (Hepatitis), virus de Parainfluenza canina, y Parvovirus canino.

La bacteria de **Nobivac® Lepto 4** está recomendada para la vacunación de perros sanos como ayuda en la prevención de la enfermedad y mortalidad causadas por *L. canicola*, *L. icterohaemorrhagiae*, *L. pomona* y *L.*

*grippotyphosa*; la prevención de leptospiuria (eliminación de *Leptospira* en orina) causada por *L. canicola*, *L. icterohaemorrhagiae*, y *L. grippotyphosa*; y como ayuda en la prevención de leptospiuria causada por *L. pomona*.

### ESPECIE

Caninos (perros)



## DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Agitar el vial de **Nobivac® Lepto 4** y transferir su contenido al vial de **Nobivac® DAPPv** de forma aséptica.

Mezclar suavemente hasta que este disuelto. Utilizar todo el contenido de inmediato después de la rehidratación. Inyectar una dosis (1 ml) por vía subcutánea.

## CALENDARIO DE VACUNACIÓN

*Vacunación básica:* La dosis inicial puede ser administrada a las 8 semanas de edad o más. Repetir en intervalos de 2-4 semanas hasta que el perro tenga 12 semanas de edad. Un mínimo de dos dosis es requerido para la inmunización primaria.

*Revacunación:* Se recomienda la revacunación anual con una dosis.

## REACCIONES ADVERSAS

En casos raros, una reacción de hipersensibilidad aguda transitoria (anafilaxis), fiebre, letargo, edema facial, vómito o diarrea pueden ocurrir poco después de la vacunación.

Los datos indican que el desarrollo de opacidad de la córnea no está asociado con el uso de este producto.

## PRECAUCIONES

- Almacenar de 2° a 7°C. No congelar.
- Utilizar agujas y jeringas nuevas, no esterilizadas químicamente.
- No mezclar con otras vacunas.
- Vacunar solamente perros sanos y desparasitados.
- No vacunar hembras gestantes.
- El uso de un producto puede producir anafilaxia y/u otras reacciones de hipersensibilidad inflamatorias inmunomediadas. **Antídoto:** La epinefrina, corticosteroides y antihistamínicos pueden estar indicados dependiendo de la naturaleza y severidad de la reacción.
- La edad en la cual el anticuerpo materno para el parvovirus canino ya no interfiere con el desarrollo de la inmunidad activa varía de acuerdo con el título de la madre y la cantidad de anticuerpos en el calostro absorbidos por el cachorro.
- Contiene gentamicina y anfotericina B como conservador.
- Incinerar los recipientes de la vacuna y todos los contenidos no utilizados.

**Intervet S.A.**  
Av. Circunvalación del Club Golf Los  
Incas 134, Torre 2, Of. 1901  
Santiago de Surco, Lima,  
T +51 1 411 5100  
[www.msd-animal-health.com.pe](http://www.msd-animal-health.com.pe)



## **PRESENTACIONES**

Caja conteniendo 25 frascos x 1 dosis, una dosis se compone de un frasco de liofilizado y uno de diluyente.

CONSULTE A SU MÉDICO VETERINARIO

## **FABRICADO POR:**

Intervet Inc.  
Omaha, NE 68103 EE.UU.

## **IMPORTADO POR:**

**Intervet S.A.**

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Of. 1901.

Santiago de Surco, Lima. - Perú.

Bajo Licencia de Intervet International B.V.,

Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta médica.

## **USO VETERINARIO**

**Registro SENASA: B.01.M.15.I.1190**