



NOBIVAC LEPTO

Ficha técnica

Vacuna bivalente inactivada contra la Leptospirosis canina causada por los serotipos *L. canicola* y *L. Icterohaemorrhagiae*.

Nobivac Lepto ejerce una protección comprobada contra la enfermedad clínica y la excreción urinaria de la bacteria eliminando así, el estado de portador renal y el riesgo humano frente a esta enfermedad zoonótica.

Nobivac Lepto ha demostrado ser segura en cachorros tan jóvenes como 6 semanas y en hembras gestantes.

Composición

Cada dosis contiene:

<i>Leptospira interrogans</i> serotipo <i>canicola</i>	≥ 957 U
<i>Leptospira interrogans</i> serogrupo <i>icterohaemorrhagiae</i> cepa 620K.	≥ 625 U
Excipientes c.s.p.	1 ml

Esquema de vacunación

Los cachorros deben tener al menos 6 semanas de edad antes de recibir la 1era vacuna. Revacunación anual o bianual según la incidencia.

Contraindicaciones

Solo deben vacunarse perros sanos y realizar un examen clínico completo antes de la vacunación. Puede usarse en hembras gestantes

Compatibilidad

Se puede utilizar sola o como reconstituyente de Nobivac DHPPi y Nobivac Puppy DP. En ésta última, en cachorros a partir de las 6 semanas de edad.

Almacenamiento

La vacuna debe ser almacenada en la oscuridad a temperaturas entre +2°C y +8°C



Formulación y presentación.

Bacterina líquida de 1 ml en cajas de 10 frascos por una dosis

FABRICADO POR:

Intervet International B.V., - Holanda.

IMPORTADO POR:

Intervet S.A.

Av. Circunvalación del Club Golf los Incas 134, Torre 2, Oficina 1901,

Santiago de Surco, Lima. - Perú.

Bajo Licencia de Intervet International B.V.,

Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta médica.

USO VETERINARIO

Registro SENASA: B.01.4.03.I.0682