



PORCILIS COLI CLOS

Ficha técnica

Descripción

Porcilis ColiClos, suspensión vacunal inyectable, para cerdos.

Composición

Cada dos ml contiene:

Componentes *E. coli*:

- F4ab adhesina fimbrial $\geq 9.3 \log_2 \text{ Ab } 1$
- F4ac adhesina fimbrial $\geq 6.5 \log_2 \text{ Ab } 1$
- F5 adhesina fimbrial $\geq 7.4 \log_2 \text{ Ab } 1$
- F6 adhesina fimbrial $\geq 7.6 \log_2 \text{ Ab } 1$
- LT toxoide $\geq 12.0 \log_2 \text{ Ab } 1$

Componentes *C. perfringens*:

- Antígeno tipo C $\geq 20 \text{ IU}$

1 Media del título de anticuerpos (Ab) obtenidos después de la vacunación en ratón

Adyuvante(s):

dl- α -acetato de tocoferol 150 mg

Excipientes c.s.p 1 dosis

Indicaciones

Para la inmunización pasiva de la progenie mediante la inmunización activa de cerdas reproductoras y hembras de reemplazo para reducir la mortalidad y los signos clínicos durante los primeros días de vida, causados por las cepas de *E. coli* que expresan las adhesinas F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F5 (K99), F6 (987P) y / o producen LT, y los causados por *C. perfringens* tipo C. Un efecto benéfico contra la infección causada por *C. perfringens* tipo A se ha observado en condiciones de campo

Contraindicaciones

Ninguna.

Reacciones adversas

Después de la vacunación se puede producir un aumento transitorio de la temperatura corporal y una inflamación transitoria puede presentarse en el sitio de la inyección.



Especie de destino

Cerdos

Dosis, métodos y vía de administración

Inyección intramuscular en cerdas reproductoras y hembras de reemplazo de 1 dosis (2 ml) de vacuna en el cuello en la zona detrás de la oreja.

Esquema de vacunación:

Vacunación básica: Cerdas reproductoras / hembras de reemplazo que no han sido vacunadas con el producto se les administra una primera inyección de 6 a 8 semanas antes de la fecha esperada de parto y una dosis de refuerzo 4 semanas después.

Revacunación: Una sola revacunación se realiza 2 a 4 semanas antes de la fecha prevista de parto.

Indicaciones para una correcta administración

Antes de usar permita que la vacuna alcance la temperatura ambiente. Agite vigorosamente antes y en intervalos durante la aplicación.

Evite la contaminación del producto.

Periodo de retiro

Cero días.

Condiciones de almacenamiento

Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.

Almacenar en refrigeración.

No congelar. Proteger de la luz.

Periodo de validez después de abierto el envase: 10 horas.

Advertencias especiales en caso necesario

Vacunar solo animales sanos

En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrole el prospecto o la etiqueta al médico.

Puede ser usado durante la gestación.

No hay información disponible sobre la seguridad y eficacia de esta vacuna en combinación con otro producto veterinario. La decisión de usar esta vacuna antes o después de usar cualquier otro producto veterinario, por lo tanto, debe hacerse caso por caso.

No mezclar con ningún otro producto veterinario.

Para uso veterinario exclusivamente.



Presentaciones:

Frasco vial x 100 ml – 50 dosis.

FABRICADO POR:

Intervet Inc. USA

IMPORTADO POR:

Intervet S.A.

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Ofi. 1901

Santiago de Surco, Lima - Perú

Bajo Licencia de Intervet International B.V.,

Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta médica.

USO VETERINARIO

Registro SENASA: B.01.4.05.I.1125