



PORCILIS GLÄSSER

Ficha técnica

Vacuna contra la enfermedad de Glässer en porcinos.

Composición

Cada 2 ml contiene:

Concentrado de células enteras inactivadas del <i>Haemophilus parasuis</i> serotipo 5, cepa 4800 con 0.05 mg NT	200 mg
Adyuvante base de dl- α -tocoferol c.s.p.	150 mg
Excipientes c.s.p.	1 dosis.

Indicación

Inmunización activa de porcinos de engorde como una ayuda en la protección contra signos clínicos de la enfermedad de Glässer causado por el *H. parasuis* serotipo 5. Para la inmunización pasiva de la progenie de cerdas y cerdas vacunadas para reducir los signos clínicos y la mortalidad causada por *Haemophilus parasuis* serotipo 4 y 5.

Dosis y administración

Inyección intramuscular de 2 ml en el cuello del porcino

Esquema de Vacunación:

Esquema de vacunación en lechones:

Vacunar cerdos de al menos cinco semanas de edad dos veces con un intervalo de dos semanas.

Esquema de vacunación en cerdas:

Vacunar a las cerdas entre 6 y 8 semanas antes del tiempo esperado de parto dos veces con un intervalo de cuatro semanas.

Esquema de revacunación de cerdas:

Para las cerdas vacunadas durante el embarazo anterior, se recomienda una única revacunación a las 4 o 2 semanas antes del parto.

Es aconsejable vacunar a los cerdos si la infección por *Haemophilus parasuis* se produce en animales mayores de la edad en que los animales están protegidos por inmunidad pasiva. En caso de infecciones anteriores, las cerdas deben ser vacunadas.



- Permitir que la vacuna alcance temperatura ambiente (15-20° C) y agitar antes de usar.
- Usar equipo de vacunación estéril
- La vacuna deberá preferiblemente ser administrada justo detrás de la oreja.

Efectos colaterales

Ligero aumento de temperatura en combinación con signos de malestar general puede ocurrir por unas pocas horas después de la vacunación.

Período de Retiro

0 días.

Almacenamiento

Almacenar entre 2 y 8° C. No congelar

Presentación

Frascos PET de 50 ml. para 25 dosis.

Notas

- No administrar junto con otros productos medicinales
- Duración después de la primera apertura: 3 horas
- En caso de inyectarse o de ingesta accidental, buscar ayuda médica inmediatamente y mostrar el empaque impreso o la etiqueta al médico.
- No hay precauciones especiales. Cualquier producto no usado o material sobrante deberá ser dispuesto de acuerdo a los requerimientos locales.

Otra información

Vacunar solamente animales sanos.

FABRICADO POR:

Intervet International B.V. Boxmeer - Holanda

Intervet S.A.
Av. Circunvalación del Club Golf
Los Incas 134, Torre 2, Ofi. 1901
Santiago de Surco, Lima - Perú
T +51 1 411 5100
www.msd-animal-health.com.pe



IMPORTADO POR:

Intervet S.A.

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Ofi. 1901

Santiago de Surco, Lima - Perú

Bajo Licencia de Intervet International B.V.,

Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta médica.

USO VETERINARIO

Registro SENASA: B.01.4.05.I.0876