



PORCILIS ILEITIS

Ficha técnica

Bacteria *Lawsonia intracellularis*

COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Denominación del ingrediente	Cantidad
<u>Ingredientes activos:</u> Aislado <i>Lawsonia intracellularis</i> , SPAH08	≥ 1.2 PR ¹

¹PR : Potencia relativa

Conservadores

Gentamicina y Timerosal

Adyuvantes*

Microsol y Fortasol

FORMA FARMACÉUTICA

Emulsión inyectable

Datos clínicos

Especies de destino

Cerdos

Indicaciones de uso, especificando las especies de destino

Porcilis Ileitis está recomendado para utilizarse en cerdos sanos de 3 meses de edad o mayores como auxiliar para controlar la ileítis provocada por *Lawsonia intracellularis*, para reducir la colonización de *Lawsonia*, así como para disminuir la duración de la excreción fecal. Se ha demostrado que la duración de la inmunidad es de por lo menos 20 semanas.

Contraindicaciones

Ninguna



Advertencias especiales para cada una de las especies de destino

Se han observado reacciones sistémicas inmediatas en animales a los que se les ha administrado el producto. Es conveniente disminuir al máximo la manipulación de los cerdos y asegurarse de que la ventilación sea adecuada antes de iniciar la vacunación.

Precauciones especiales para su uso

Precauciones especiales para uso en animales

Ninguna

* En algunos mercados la combinación de los adyuvantes Microsol y Fortasol es conocida como Microsol Diluvac Forte.

Precauciones especiales que debe tomar la persona que administra el producto médico a los animales

Se debe tener cuidado para evitar inyectarse en los dedos, manos u otras partes del cuerpo. Una inyección accidental puede provocar reacciones locales serias. Consulte a un médico de inmediato.

Efectos adversos (frecuencia y severidad)

Un número importante de cerdos puede experimentar una inflamación temporal en la zona inyectada. Esta inflamación debe remitir sin tratamiento alguno en menos de 20 días. Si ocurre una reacción alérgica, tratar al animal con epinefrina.

Uso durante la gestación, la lactancia o la puesta

La seguridad de este producto no ha sido establecida durante la gestación o la lactancia.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

No existe información disponible sobre la seguridad y eficacia de esta vacuna cuando se utiliza con cualquier otro medicamento de uso veterinario. Por lo tanto, la decisión de usar esta vacuna antes o después de cualquier otro medicamento veterinario se debe tomar dependiendo de cada caso.

Cantidades para administrar y vía de administración

La vacuna es un producto líquido listo para utilizarse. Antes de usar la vacuna permita que alcance la temperatura ambiente y agítela bien.

Evite la introducción de contaminantes.

La vacuna se administra a cerdos de 3 semanas de edad o mayores mediante una inyección intramuscular con una dosis de 2 ml.



Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia, antídotos) (en caso necesario)

No existe diferencia alguna con la administración de una dosis sencilla (vea 4.6)

Periodo de retiro

21 días

PROPIEDADES INMUNOLÓGICAS

Porcilis Ileitis es una vacuna con adyuvante que contiene la bacteria *Lawsonia intracellularis* inactivada como ingrediente activo. La vacuna contiene un adyuvante de aceite en agua para estimular una respuesta inmune prolongada.

DATOS FARMACÉUTICOS

Incompatibilidades

No se conocen.

Periodo de validez

24 meses

Precauciones especiales de almacenamiento

Almacenar en un lugar oscuro a una temperatura de 2 – 7°C.

Naturaleza y composición del empaque inmediato

Frascos plástico de 100 y 500 ml. Los frascos están cerrados con un tapón de hule sintético y sellado con tapa de aluminio.

Precauciones especiales para la eliminación del producto no utilizado o los residuos derivados de su uso

Cualquier producto no utilizado o material de desecho derivado del mismo debe eliminarse de acuerdo con las normas locales.

FABRICADO POR:

Intervet Inc.,
Omaha NE 68103
USA,

Intervet S.A.
Av. Circunvalación del Club Golf
Los Incas 134, Torre 2, Of.1901
Santiago de Surco, Lima - Perú
T +51 1 411 5100
www.msd-animal-health.com.pe



IMPORTADO POR:

Intervet S.A.

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, oficina 1901.

Santiago de Surco, Lima - Perú.

Bajo Licencia de Intervet International B.V.,

Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta médica.

Registro SENASA: B.14.4.05.I.0031