



PORCILIS PCV

Ficha técnica

Solución vacunal inyectable.

Descripción

Es una vacuna subunitaria inactivada con adyuvante que contiene la proteína ORF2 del Circovirus porcino tipo 2 como ingrediente activo, es una emulsión agua en aceite para estimular una respuesta inmunológica sostenida.

Composición

Sustancia activa

Antígeno subunitario ORF2 PCV2..... $\geq 4.5 \log_2$ títulos de anticuerpos

Excipiente c.s.p..... 2 ml.

Indicaciones de uso

La vacuna se recomienda para uso en cerdos saludables, como ayuda en la reducción de la carga y excreción viral del Circovirus porcino tipo 2. El uso de la vacuna resulta en un incremento diario de la ganancia de peso de cerdos afectado por la enfermedad del Circovirus porcino (PCVD) durante el periodo del engorde.

Dosis y vía de administración y modo de empleo

La vacuna es un producto líquido y listo para utilizarse.

Agite bien antes de usarla.

Vacunación

1) En el caso de niveles bajos de anticuerpo materno contra PCV2, o cuando se producen PCVD a una edad tardía, se recomienda una sola vacunación:

Administrar (una dosis de 2 ml), por inyección intramuscular en el cuello en el área detrás de la oreja, a cerdos a partir de las 3 semanas de edad en adelante.

2) En el caso donde se prevé la presencia de niveles más altos de anticuerpo materno contra PCV2, se recomienda el siguiente cronograma de dos vacunaciones:



Administrar (una dosis de 2 ml), por inyección intramuscular en el cuello en el área detrás de la oreja, según el siguiente cronograma:

- La primera inyección (2 ml) puede administrarse a partir de los 3-5 días de edad, y la segunda inyección (2 ml) 2-3 semanas después.

Antes de usar la vacuna, deje que este alcance la temperatura ambiente. Use jeringas y agujas esterilizadas. Evite la introducción de contaminantes. Evite el uso de equipos de vacunación con partes de goma.

Advertencia y recomendaciones:

Pueden presentarse reacciones leves en el sitio de la inyección.

Si se presentan reacciones anafilácticas, tratar con epinefrina.

Utilizar solo en animales sanos.

No usar en hembras gestantes ni durante la lactancia

No usar en forma concomitante con otros medicamentos.

Dejar que la vacuna alcance la temperatura de 20 – 25°C antes de su aplicación.

Efectos adversos

Un aumento transitorio de la temperatura corporal puede ocurrir hasta 2 días después de la vacunación. Algunos lechones pueden estar deprimidos y presentar un menor consumo de alimento por algunos días.

Una reacción local transitoria en el sitio de inyección puede ser observada.

Puede ocurrir una reacción de hipersensibilidad, los animales se recuperarán en los minutos siguientes sin necesidad de tratamiento alguno.

Condiciones de almacenamiento

Almacenar en un sitio oscuro a una temperatura entre +2 a +8°C. No congelar.

Periodo de retiro:

No tiene (0 días)

Presentaciones:

Frasco vial x 100 ml y 200 ML– 50 y 100 dosis.

Intervet S.A.
Av. Circunvalación del Club Golf
Los Incas 134, Torre 2, Ofi. 1901
Santiago de Surco, Lima - Perú
T +51 1 411 5100
www.msd-animal-health.com.pe



FABRICADO POR:

Intervet International B.V. Boxmeer – Holanda.

IMPORTADO POR:

Intervet S.A.

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, oficina 1901.

Santiago de Surco, Lima - Perú.

Bajo Licencia de Intervet International B.V.,

Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta médica.

Registro SENASA: B.14.2.05.I.0002