



PORCILIS PCV M Hyo

Ficha técnica

Solución vacunal inyectable.

Descripción

Es una vacuna subunitaria inactivada con adyuvante que contiene la proteína ORF2 del Circovirus porcino tipo 2 como ingrediente activo, es una emulsión agua en aceite para estimular una respuesta inmunológica sostenida.

Composición

Sustancia activa

Antígeno subunitario ORF2 PCV2..... ≥ 1414 AU¹

M. hyopneumoniae inactivada..... ≥ 2.21 RPU²

Excipiente *c.s.p.*..... 2 ml.

¹ Porcilis PCV M Hyo está mezclada con 2500 AU (Unidades Antigénicas) de ORF2 del PCV2 por mL. En el producto final se detectan al menos 1414 AU/mL como lo determina la prueba de masa antigénica ELISA.

² La RPU (=unidad de potencia relativa) del producto final se determina mediante la prueba de masa

Indicaciones de uso

Para la inmunización activa de cerdos con el fin de reducir la viremia, la carga viral en órganos y tejidos linfáticos y la propagación del virus causante de una infección con PCV2 como así también la severidad de las lesiones pulmonares causadas por una infección con *Mycoplasma hyopneumoniae*. También ayuda en la reducción de la pérdida de peso diario y la mortalidad asociadas a infecciones con PCV2 y/o *Mycoplasma hyopneumoniae*.

PCV2:

Inicio de la inmunidad: 2 semanas.

Duración de la inmunidad: 22 semanas.

M. hyopneumoniae:

Inicio de la inmunidad: 4 semanas.

Duración de la inmunidad: 21 semanas.

Contraindicaciones

Ninguna.



Reacciones adversas (frecuencia y gravedad)

El día de la vacunación, se puede observar un aumento transitorio de temperatura de un 1°C aproximadamente. Esta situación se normaliza al día siguiente. En algunos animales se puede observar reacciones sistémicas leves hasta el día siguiente a la vacunación. Se pueden detectar reacciones locales transitorias en los sitios de inyección.

Especies de destino

Cerdos.

Posología y vía de administración

Aplicar una dosis de 2 ml por vía intramuscular en cerdos a partir de las 3 semanas de edad.

Antes de utilizar la vacuna, permitir que alcance la temperatura ambiente y agitar bien antes de usar. Evitar el ingreso de contaminación.

Precauciones especiales de almacenamiento

Refrigerar (+2°C - +8°C). No congelar. Proteja el producto de la luz solar. Una vez abierto el envase, utilice el producto dentro de las 8 horas siguientes.

Precauciones especiales para su uso en animales

Vacunar solo animales sanos.

Precauciones especiales que debe tomar la persona que administre el producto a animales

Al usuario:

Este producto contiene aceite mineral. La aplicación por accidente / auto aplicación puede provocar dolor severo e hinchazón, en particular si se aplica en articulaciones o en los dedos. En casos aislados puede resultar en la pérdida del dedo si no se recibe atención médica de forma inmediata. Si accidentalmente se aplica este producto, incluso si la cantidad es escasa, consulte a su médico a la brevedad y muéstrela este prospecto. Si el dolor persiste por más de 12 horas luego de la consulta a su médico, vuelva a consultar.

Al médico:

Este producto contiene aceite mineral. Incluso una cantidad escasa puede provocar hinchazón grave que resulte, por ej., en necrosis isquémica o incluso la pérdida de un dedo. Se requiere la atención quirúrgica urgente de un experto y se puede precisar una incisión anticipada e irrigación de la zona afectada,



especialmente cuando se involucra la yema del dedo o un tendón.
No se encuentra disponible información sobre la seguridad y eficacia de esta vacuna cuando se la aplica en simultáneo con otro medicamento veterinario.
Se debe decidir sobre la aplicación de esta vacuna antes o después de la administración de otro medicamento veterinario en cada caso en particular.
No mezclar con otros medicamentos veterinarios.

Condiciones de almacenamiento

Almacenar en un sitio oscuro a una temperatura entre +2 a +8°C. No congelar.

Periodo de retiro:

No tiene (0 días)

Presentaciones:

Frasco vial x 100 ml y 200 ML– 50 y 100 dosis.

FABRICADO POR:

Intervet International B.V. Boxmeer – Holanda.

IMPORTADO POR:

Intervet S.A.

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, oficina 1901.

Santiago de Surco, Lima - Perú.

Bajo Licencia de Intervet International B.V.,

Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta médica.

Registro SENASA: B.01.A.05.I.1186