



POSATEX

Ficha técnica

Gotas óticas en suspensión para perros

Composición

Activo:

Orbifloxacina	8.50 mg
Furoato de mometasona (en forma de monohidrato)	0.90 mg
Posaconazol	0.90 mg
Excipientes c.s.p.	1 ml

Especie de destino

Perros

Indicaciones

Para el tratamiento de la otitis aguda externa y de exacerbaciones agudas de otitis externa recurrente, asociada con bacterias susceptibles a la Orbifloxacina y hongos susceptibles a Posaconazol, en particular *Malassezia pachydermatis*.

Dosificación y vía de administración

Para uso auricular/ótico

Una gota contiene 244 µg de Orbifloxacina, 24 µg de Furoato de mometasona y 24 µg de Posaconazol.

Agítese bien antes de su uso.

Perros que tengan un peso menor a 2 Kg, aplicar 2 gotas al oído una vez al día.

Perros que tengan un peso de 2 a 15 Kg, aplicar 4 gotas al oído una vez al día.

Perros que tengan un peso de 15 Kg o más, aplicar 8 gotas al oído una vez al día.

Para utilizarse a temperatura ambiente (no infunda material frío dentro del oído).

El tratamiento deberá continuarse por 7 días consecutivos.



Recomendaciones para su correcta administración

El canal del oído externo deberá limpiarse y secarse meticulosamente antes del tratamiento. El exceso de pelo alrededor del área a tratar deberá cortarse. Después de la aplicación, deberá darse masaje a la base de la oreja de forma breve y gentil, para permitir que la preparación penetre a la parte más baja del canal auditivo

Contraindicaciones

No se utilice si el tímpano se encuentra perforado.

No se use en caso de hipersensibilidad a cualquiera de los ingredientes del producto medicinal veterinario, a los corticoides, a otros agentes antifúngicos de tipo azol y a otras fluoroquinolonas

Reacciones adversas.

Se han observado lesiones eritematosas leves.

El uso de preparaciones óticas puede asociarse con daño al oído, normalmente temporales y principalmente en perros geriátricos. Si observa cualquier efecto grave u otros efectos que no se mencionan en este folleto, por favor repórtelo a su médico veterinario.

Advertencias especiales

La otitis bacteriana y la otitis fúngica frecuentemente son de naturaleza secundaria. La causa subyacente deberá identificarse y aplicarse el tratamiento apropiado

Antes de que se aplique el producto medicinal veterinario, debe examinarse a detalle el canal auditivo externo para asegurarse de que el tímpano no se encuentra perforado para evitar el riesgo de la transmisión de la infección al oído medio y para prevenir daño al aparato vestibular y a la cóclea.

No se utilice durante el periodo total o parte de la gestación. El uso del producto medicinal veterinario no está recomendado durante la lactancia. La inocuidad del producto medicinal veterinario no se ha establecido durante la gestación o la lactancia.

No se ha demostrado su compatibilidad con limpiadores óticos. El uso de este producto de forma concurrente con un limpiador ótico con un pH alto no se recomienda.

Lave sus manos cuidadosamente después de aplicar el producto medicinal veterinario. Evite el contacto con la piel. En caso de exposición accidental, enjuague el área afectada con grandes cantidades de agua.



Periodo de retiro.

No aplica.

Condiciones especiales de almacenamiento.

No se almacene por arriba de los 25 °C.
Almacénese en los frascos y cartón originales

Presentación

Frascos gotero de 8.8 ml, 17.5 ml y 35.1 ml.

FABRICADO POR:

Intervet International GmbH - Alemania.

IMPORTADO POR:

Intervet S.A.

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2 Of. 1901

Santiago de Surco - Lima

Bajo Licencia de Intervet International B.V.,

Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta médica.

USO VETERINARIO

Registro SENASA: F.B1.82.I.0001