



ZUPREVO

40 mg/ml

Ficha técnica

Antibacteriano en solución inyectable para ganado porcino a base de Tildipirosina.

Composición

Sustancia activa:

Tildipirosina 40 mg

Excipientes c.s.p. 1 ml

Especies de destino

Porcinos

Indicaciones

Para el tratamiento del Complejo respiratorio (CRP) asociado con *Actinobacillus pleuroneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Bordetella bronchiseptica* y *Haemophilus parasuis* sensibles a la Tildipirosina.

Dosis y vía de administración

Administrar 4 mg de Tildipirosina por kg de peso vivo (equivalente a 1 ml / 10 kg peso vivo) una sola vez por la vía intramuscular.

Advertencias para la correcta administración

- Divida la dosis de tal forma que no se apliquen más de 5 ml en un solo sitio.
- El tapón de goma del vial puede ser perforado con seguridad hasta 20 veces. De lo contrario, se recomienda el uso de una jeringa de dosis múltiples.
- Para garantizar la correcta dosificación y evitar la sobredosificación, el peso corporal se debe determinar con la mayor precisión posible.
- Se recomienda tratar a los animales en las etapas tempranas de la enfermedad y evaluar la respuesta al tratamiento dentro de las primeras horas después de la inyección. Si los signos clínicos del complejo respiratorio persisten o aumentan, el tratamiento debe ser cambiado



usando otro antibiótico y continuar hasta que los signos clínicos se hayan resuelto.

Contraindicaciones

No usar en caso de hipersensibilidad a los antibióticos macrólidos, al ácido cítrico monohidratado o al propilenglicol.

Reacciones adversas

Durante las pruebas clínicas se observó inflamación en el sitio de aplicación en el 3% de los cerdos tratados. Estas inflamaciones se resolvieron dentro de los días 1 al 6. Dolor en el lugar de la inyección se observó en el 16% de los cerdos tratados

Tras la inyección del máximo volumen recomendado de 5 ml, las reacciones patomorfológicas en el sitio de inyección se resolvieron completamente dentro de los 21 días.

Si usted nota cualquier otro efecto de gravedad u otro tipo de efecto no mencionado en este prospecto, por favor informe a su Médico Veterinario.

Advertencias especiales.

Precauciones para su uso en animales:

Administrar estrictamente por vía intramuscular

La seguridad del medicamento veterinario no se ha establecido durante el embarazo o la lactancia. Sin embargo, no hubo evidencia de efectos selectivos del desarrollo o la reproducción en ninguno de los estudios de laboratorio.

Utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación beneficio/ riesgo efectuado por el veterinario responsable.

Puede haber resistencia cruzada con otros macrólidos. No administrar con antimicrobianos con un modo de acción similar tales como otros macrólidos o lincosamidas.

Siempre que sea posible el medicamento veterinario debe ser utilizado únicamente en base a pruebas de sensibilidad.

En ausencia de estudios de compatibilidad, este producto veterinario no debe ser mezclado con otros productos médicos veterinarios.

Advertencias especiales para el usuario del producto veterinario:

Se debe tener especial cuidado para evitar la auto-inyección. En caso de auto-inyección accidental busque ayuda médica inmediatamente y muéstrela este prospecto o la etiqueta al Médico.

La tildipirosina puede causar sensibilización al contacto con la piel. Si ocurre exposición accidental, lave la piel inmediatamente con agua y con jabón. Si accidentalmente entra en contacto con los ojos, enjuague los ojos con agua limpia.



Lávese las manos después de usar.

Cualquier producto no utilizado o material de desecho derivado del uso de este producto veterinario se debe desechar de acuerdo con la regulación local.

Período de retiro.

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo hasta 9 días después de finalizado el tratamiento.

Almacenamiento

No almacenar a temperaturas mayores a 30 °C.

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el vial.

Caducidad del producto una vez abierto el vial: 28 días.

Presentación

Frasco de: 100 ml.

FABRICADO POR:

Intervet International GmbH – Alemania.

IMPORTADO POR:

Intervet S.A.

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Ofi. 1901

Santiago de Surco, Lima - Perú

Bajo Licencia de Intervet International B.V.,

Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta médica

USO VETERINARIO

Registro SENASA: F.03.01.I.1757