



# NOBIVAC RABIES

## Ficha técnica

Cultivo inactivado del virus de la Rabia (cepa Pasteur) para especies como perros, gatos, hurones (ferrets), bovinos, equinos, ovejas, cabras y zorros.

### **Composición**

Nobivac rabia contiene un cultivo inactivado del virus de la Rabia, clonado de la cepa Pasteur RIV con una potencia de 2 U.I. el virus es desarrollado en la línea celular bhk21 clone CT e inactivado con betapropiolactona. Se presenta como una vacuna con fosfato de aluminio como adyuvante.

### **Programa de vacunación.**

	<b>Perro/Gato</b>	<b>Bovinos /Caprinos / Ovinos/Caballos</b>	<b>Hurones</b>
1era Vacunación (*)	3 meses	6 meses	3 meses
Revacunación (**)	3 años	2 años	1 año
Vía de administración.	I.M Y S.C	I.M	S.C

(\*) Puede ser administrada a cualquier edad, pero si es antes de la fecha indicada, se tendrá que revacunar a la edad que ese indica

(\*\*) Varía de acuerdo con las legislaciones locales vigentes (en el caso del Perú es cada año)

Los resultados de investigaciones serológicas indican que la vacunación de ovejas, cabras y zorros proporciona una protección de al menos 1 año.



### **Reacciones vacunales**

Ocasionalmente puede observarse un nódulo palpable transitorio en el lugar de la inoculación después de la administración subcutánea.

### **Período de supresión**

Ninguno.

### **Nota**

- Vacunar solamente animales sanos.
- Ocasionalmente pueden producirse reacciones de hipersensibilidad generalizada después de la administración. En este caso, puede estar indicado administrar una inyección de adrenalina por vía subcutánea.
- Permitir que la vacuna alcance la temperatura ambiente (15-25°C) antes de su uso. Administrar la vacuna a temperatura corporal
- Utilizar un equipo de inyección estéril.
- Agitar antes y durante su uso.
- Nobivac Rabia puede emplearse para reconstituir las vacunas caninas liofilizadas Nobivac.
- Nobivac Rabia puede administrarse combinada con Nobivac Lepto.
- Nobivac Rabia puede emplearse para reconstituir la vacuna liofilizada Nobivac Tricat.

### **Dosis y vía de administración**

1ml por vía subcutánea o intramuscular

### **Almacenamiento**

La vacuna debe ser almacenada en la oscuridad a temperaturas entre +2°C y +8°C

### **Formulación y presentación.**

Vacuna inactivada líquida en cajas con 10 y 50 viales por una dosis y frascos por 10 dosis

### **Fabricado por:**

Intervet International B.V. Boxmeer - Holanda

**Intervet S.A.**  
Av. Circunvalación Club Golf  
Los Incas134, Torre 2 OF. 1901  
Santiago de Surco.  
Lima - Perú  
T +51 1 411 5100  
[www.msd-animal-health.com.pe](http://www.msd-animal-health.com.pe)



**Importado por:**

**Intervet S.A.**

Av. Circunvalación Club Golf Los Incas 134, Torre 2 piso 1901-

Santiago de Surco, Lima - Perú.

Bajo Licencia de Intervet International B.V.,

Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta médica.

**USO VETERINARIO**

**Registro SENASA: B.01.2.07.I.398**