



BIOXAN COMPUESTO®

Ficha técnica.

Es una solución que presenta una formulación completa que satisface las necesidades de un medicamento con características hidratante, restaurativa, energética, antitóxica y polivitamínica. Ese producto está indicado en el auxilio del tratamiento de enfermedades, deshidratación y agotamiento por esfuerzo físico o exceso de producción.

Composición

Forma Farmacéutica: Solución.

FÓRMULA: Cada 100 mL contiene:

Cloruro de Calcio Dihidratado (Equivalente a 10,85 mg de Calcio)	39,8 mg
Cloruro de Magnesio Hexahidratado (Equivalente a 4,09 mg de Magnesio)	34,2mg
Cloruro de Potasio (Equivalente a 26,22 mg de Potasio)	50,0 mg
Cloruro de Sodio (Equivalente a 157,35 mg de Sodio)	400,0 mg
Cloruro de Colina	300,0 mg
Dextrosa Anhidra	6000,0 mg
Metionina DL	600,0 mg
Nicotinamida	240,0 mg
Cianocobalamina (Vitamina B12)	2000 mcg
Riboflavina (Vit B2) (Equivalente a 27,33 mg de Vit. B2 5 Fosfato Sódico)	20,0 mg
Piridoxina (Vitamina B6) (Clorhidrato de Piridoxina)	3,0 mg
Vehículo c.s.p.	100 mL

Indicaciones.

Bovinos y equinos en cualquier grupo de edad.

El producto posee vitaminas del complejo B que ayudan en los casos de reducción de apetito, adelgazamiento y anemia. La dextrosa es una fuente de energía importante que también colabora en el mantenimiento de la volemia. Las sales integrantes de la fórmula mantienen el equilibrio hidroelectrolítico y el ácido básico. La metionina y la colina son aminoácidos esenciales que restauran las funciones orgánicas hepática y renal.



Dosis y Vía de Administración.

Aplicar el producto por 3 días consecutivos con un intervalo de 24 horas, por vía intravenosa administrándose lentamente.

Dosis diarias:

Bovinos y equinos adultos 1000 a 2000 mL

Becerras y potros 500 mL

Hay que desarrollar una asepsia adecuada en el lugar de la aplicación y administrar el producto lentamente para mejor aprovecharlo.

Es posible adoptar otras posologías según el criterio del médico veterinario.

Precauciones generales.

- Limpiar y desinfectar el lugar de aplicación para evitar inflamaciones locales y sus complicaciones a causa de contaminación por microbios;
- No utilizar el producto fuera de la fecha de caducidad;
- No utilizar el producto en animales con historia de hipersensibilidad a los componentes de la fórmula e interrumpir el uso del medicamento al detectar cualquier tipo de reacción adversa;
- Desechar eventuales restos del producto y envases utilizados;
- No utilizar nuevamente los envases vacíos.

Periodo de retiro:

BOVINOS Y EQUINOS: SACRIFICIO: TIEMPO DE RETIRO CERO

BOVINOS: LECHE: TIEMPO DE RETIRO CERO

Almacenamiento:

Mantener protegido de la luz y a una temperatura inferior de 25 °C.

FABRICADO POR:

VALLÉE S/A – BRASIL

Montes Claros – Minas Gerais – Brasil.

Intervet S.A.
Av. Circunvalación del Club Golf
Los Incas 134, Torre 2, OF. 1901
Santiago de Surco, Lima.
T +51 1 411 5100

www.msd-animal-health.com.pe



IMPORTADO POR:

Intervet S.A.

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, OF. 1901 Santiago de Surco. Lima - Perú.

Bajo Licencia de Intervet International B.V.,

Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta médica.

USO VETERINARIO

Registro SENASA: F. F4.01. I.0054