



BRAVECTO Tabletas

Ficha técnica

Para el tratamiento de infestaciones por garrapatas y pulgas en perros

Fórmula

Cada tableta contiene:

Fluralaner (micronizado)	136.4 mg
Excipientes c.s.p.	1 g

Indicaciones

Para el control de infestaciones por garrapatas y pulgas en perros con actividad inmediata y de larga duración durante 12 semanas. Proporciona una actividad para matar garrapatas (*Ixodes ricinus*, *Ixodes hexagonus*, *Ixodes scapularis*, *Ixodes holocyclus*, *Dermacentor reticulatus*, *Dermacentor variabilis* y *Rhipicephalus sanguineus* (adultas y juveniles) y pulgas (*Ctenocephalides felis* y *Ctenocephalides canis*). Previene la transmisión de *Babesia canis* como mínimo 12 semanas.

Para el tratamiento de la demodicosis causada por *Demodex spp.*, sarna sarcóptica e infestaciones por ácaros *Otodectes spp.* en perros.

Especies de destino

Caninos

Forma Farmacéutica

Tabletas masticables para su administración oral.

Vía de Administración

Para la administración por vía oral.

Bravecto es una tableta masticable y es bien aceptada por la mayoría de los perros. Si el animal no toma la tableta voluntariamente, puede administrarla junto con el alimento o dársela directamente en el hocico. Se debe observar al perro durante la administración para confirmar que haya tragado la tableta.

Dosis y Método de Administración

Las tabletas masticables Bravecto deben administrarse de acuerdo con la siguiente tabla (correspondiente a una dosis de 25-56 mg de Fluralaner/kg dentro de un rango de peso del perro):



Peso (kg) del perro	Número y concentración de la tableta a administrarse				
	Bravecto 112.5 mg	Bravecto 250 mg	Bravecto 500 mg	Bravecto 1000 mg	Bravecto 1400 mg
2 – 4.5	1				
>4.5 - 10		1			
>10 - 20			1		
>20 -40				1	
>40 - 56					1

Presentaciones:

Las tabletas son de diferentes tamaños de acuerdo al tamaño del perro y peso corporal.

La tabla a continuación muestra las cinco concentraciones y presentaciones de las tabletas, los pesos de la tableta y los rangos del peso corporal en perros.

Rango del peso corporal canino (kg)	Peso de tableta masticable (g)	Concentración de Fluralaner (mg/tableta)	Rango del peso corporal canino (kg)
Perros muy pequeños	0.82	112.5	2 - 4.5
Perros pequeños	1.83	250	>4.5 - 10
Perros medianos	3.67	500	>10 - 20
Perros grandes	7.33	1000	>20 - 40
Perros muy grandes	10.26	1400	>40 - 56

Las tabletas masticables no se deben romper o dividir.

Para perros con un peso corporal superior a 56 kg, utilizar una combinación de dos tabletas que coincidan lo más posible a su peso corporal.

Método de Administración:

Administrar Bravecto tabletas masticables a la hora o cerca de la hora de comer.

Esquema de Tratamiento:

Para un óptimo control de la infestación por pulgas, el producto se debe administrar en intervalos de 12 semanas. Para un óptimo control de la infestación por garrapatas, el tiempo de retratamiento depende de la especie de la garrapata.

Consejos para la Administración Correcta

Las tabletas masticables no deben partirse o dividirse.



Administre las tabletas masticables Bravecto a la hora o cerca de la hora en que se alimente al perro.

Contraindicaciones

No se utilice en caso de hipersensibilidad conocida a las sustancias activas o a alguno de los excipientes.

Reacciones Adversas

En los estudios clínicos se observaron casos raros (1.6%) en los que se presentaron síntomas gastrointestinales transitorios tales como diarrea, vómito, inapetencia y babeo, relacionados con la vía de administración del producto.

Si usted observa algún efecto grave u otros efectos no mencionados en este inserto, por favor informe a su médico veterinario.

Advertencias Especiales

Advertencias especiales para cada una de las especies de destino:

El riesgo de transmisión de enfermedades parasitarias se disminuye sustancialmente debido al rápido inicio de la acción acaricida e insecticida. Los parásitos deben comenzar a alimentarse del huésped para quedar expuestos al Fluralaner; por lo tanto, el riesgo de transmisión de enfermedades parasitarias no puede excluirse si las condiciones son desfavorables.

Precauciones especiales para su uso en animales

A falta de información disponible, el producto no debe utilizarse en cachorros de menos de 8 semanas de edad y/o en perros que pesen menos de 2 kg.

Precauciones especiales que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:

Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo.

No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.

Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.

Gestación, lactancia y fertilidad:

Este producto se puede utilizar en la reproducción, gestación y lactación en perros.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

Ninguna conocida.



Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

Se demostró la seguridad del producto en hembras en reproducción, gestantes y lactantes tratadas con sobredosis hasta 3 veces la dosis máxima recomendada.

Se demostró la seguridad en cachorros de 8 a 9 semanas de edad y con un peso de 2.0 a 3.6 kg tratados con una sobredosis hasta 5 veces la dosis máxima recomendada en tres ocasiones a intervalos más breves a los recomendados (intervalos de 8 semanas).

El producto de uso veterinario fue bien tolerado en raza Collies con resistencia a múltiples fármacos (MDR1 -/-) después de una única administración oral 3 veces mayor a la dosis recomendada.

Incompatibilidades:

No se conocen.

Precauciones Especiales de Almacenamiento

No almacenar a más de 30°C.

No se utilice después de la fecha de caducidad que aparece en el blíster. La fecha de caducidad se refiere al último día del mes indicado.

Tiempo de Retiro

No aplica.

Presentaciones:

Caja de cartón con 1 blíster de aluminio sellado con una tapa de aluminio laminado que contiene 1, 2 o 4 tabletas masticables.

Es probable que no se comercialicen todas las presentaciones.

Precauciones especiales para la eliminación del producto no utilizado o los materiales de desecho.

Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.

Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el medio ambiente.

Intervet S.A.
Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Oficina 1901.
Santiago de Surco, Lima - Perú
T +51 1 411 5100
www.msd-animal-health.com.pe



FABRICADO POR:
Intervet GesmbH
Siemensstraße 107
1210, Viena, Austria.

IMPORTADO POR:

Intervet S.A.

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Oficina 1901

Santiago de Surco, Lima - Perú

Bajo Licencia de Intervet International B.V.,

Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta médica.

USO VETERINARIO

Registro SENASA:

Bravecto 112.5 mg: F.87.31.I.0164

Bravecto 250 mg: F.87.31.I.0147

Bravecto 500 mg: F.87.31.I.0131

Bravecto 1000 mg: F.87.31.I.0146

Bravecto 1400 mg: F.87.31.I.0148