



COBACTAN 2.5%

Ficha técnica

Es una suspensión inyectable que contiene Cefquinoma, una moderna cefalosporina de 4^a generación. La forma molecular de cefquinoma, facilita una rápida absorción y distribución tisular, alcanzando concentraciones terapéuticas en suero en pocos minutos. La penetración a través de la pared celular de las bacterias es muy rápida, resultando en una rápida curación posterior a la inyección. Cefquinoma presenta un amplio espectro de actividad contra bacterias Gram+ y Gram-, tales como *Pasteurella spp.*, *Salmonella spp.*, *E. coli*, *Staphylococcus spp.*, *Clostridium spp.*, *Haemophilus somnus*, *Actinobacillus spp.* y *Erysipelothrix rhusiopathiae*. Cefquinoma es muy resistente contra bacterias productoras de β -lactamasas.

Composición

Contiene:

Cefquinoma (como sulfato)	25 mg.
Excipientes c.s.p.	1 ml.

Formulación

Suspensión oleosa para inyección lista para su uso.

Indicaciones

Para el tratamiento de infecciones causadas por bacterias sensibles a cefquinoma, tales como:

Infecciones del tracto respiratorio en bovinos o cerdos causadas por *Pasteurella spp.*, *Mannheimia spp.*, *Haemophilus spp.*, *Actinobacillus pleuropneumoniae* y *Streptococcus suis*.

Infecciones podales en bovinos (dermatitis digital, necrobacilosis interdigital, abscesos plantares, etc.).

Mastitis aguda por *E. coli*.

Infecciones generalizadas severas (ej.: septicemia por *E. coli* en terneros y lechones).

Síndrome M.M.A. en cerdas.



Dosis

Bovinos: Infecciones respiratorias y podales: 2 ml / 50 kg de peso vivo (equivalente a 1 mg / kg). Inyección intramuscular diaria por 3-5 días.

Porcinos: cuadros respiratorios: 1 – 2 ml / 25 kg de peso vivo por 3 días. M.M.A. en Cerdas: 2 ml / 25 kg de peso vivo por 2 días.

Síndrome MMA, aplicar 2 mL por cada 25 kg de peso, lo cual equivale a suministrar 2 mg de cefquinoma por kg de peso. Suministrar esta dosis diariamente, durante 2 días consecutivos, vía intramuscular.

Frecuencia de administración en todas las especies: cada 24 horas.

Método de administración

Mediante inyección intramuscular.

Importante: No inyectar más de 10 ml en el mismo punto de inyección. Si la dosis es mayor, se debe dividir en distintos puntos en la tabla del cuello.

Cobactan® presenta un margen de seguridad de hasta 10 veces la dosis terapéutica.

Agitar bien antes de usar.

Período de retiro

Carne:	Bovinos y equinos: 5 días.
	Porcinos: 2 días
Leche:	No consumir en el tratamiento y 24 horas después.

Presentación

Frascos de 100 ml.

Condiciones de almacenamiento

Almacenar a temperatura ambiente no superior a 25°C.

Contraindicaciones

No usar en animales con antecedentes de hipersensibilidad a cefalosporinas.

Precauciones y advertencias

Operadores alérgicos a cefalosporinas deben evitar el contacto de la piel con el producto.

Intervet S.A.
Av. Circunvalación del Club Golf
Los Incas 134, Torre 2, Of. 1901,
Santiago de Surco Lima - Perú
T +51 1 411 5100
www.msd-animal-health.com.pe



FABRICADO POR:

Intervet International GmbH – Alemania

IMPORTADO POR:

Intervet S.A.

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Of. 1901,

Santiago de Surco, Lima - Perú

Bajo Licencia de Intervet International B.V.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta médica.

Registro SENASA: F.03.01.I.0593