



COBACTAN LC

Ficha técnica

Ungüento antibiótico intramamario para el periodo de lactación en vacas

Composición

Cada jeringa contiene:

Cefquinoma (como sulfato de cefquinoma)	75 mg
Excipiente c.s.p.	8 g.

Especies de destino

Vacas en lactación.

Indicaciones

Tratamiento de mastitis clínicas en vacas lecheras en lactación, producidas por los siguientes organismos sensibles a la cefquinoma: *Streptococcus uberis*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Staphylococcus aureus* y *Escherichia coli*.

Método y vía de administración

El contenido de una jeringa debe ser infundido cuidadosamente por el pezón del cuarterón infectado cada 12 horas después de tres ordeños sucesivos.

Instrucciones para una correcta administración

Ordeñar a fondo los cuarterones afectados. Tras una limpieza meticulosa y la desinfección del pezón y del orificio del mismo con la toallita limpiadora incluida, infundir cuidadosamente el contenido de una jeringa en cada uno de los cuarterones afectados. Dispersar el producto masajeando suavemente el pezón y la ubre del animal afectado.

Contraindicaciones

No administrar a animales con hipersensibilidad conocida a antibióticos cefalosporinas y otros antibióticos β -lactámicos.

Reacciones adversas

Si observa cualquier efecto adverso, por favor informe del mismo a su veterinario.



Advertencias especiales

Ninguna conocida

Tiempo de retiro

Carne: 2 días

Leche: 84 horas (7 ordeños)

Almacenamiento

No almacenar a temperaturas superiores a 25 °C.

Presentación

Caja con 15 jeringas

FABRICADO POR:

Intervet International B.V. – Boxmeer – Holanda

IMPORTADO POR:

Intervet S.A.

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Of. 1901,

Santiago de Surco. Lima – Perú.

Bajo Licencia de Intervet International B.V.,

Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta médica.

USO VETERINARIO

Registro SENASA: F.03.69.I.1680