



NOBILIS CAV P4

Ficha técnica

Es una vacuna viva atenuada, contra la anemia infecciosa aviar (AIA), desarrollada en embrión de pollo.

Composición

Contiene:

Virus de la anemia infecciosa aviar cepa 26P4	3.0 log ₁₀ DICT ₅₀
Excipientes <i>c.s.p.</i>	1 dosis.

Diluyente (Dilavia)	75mg/ml de acetato dl-alfa-tocoferol.
---------------------	---------------------------------------

Formulación

Pastilla liofilizada y diluyente en suspensión para inyección intramuscular, o subcutánea y para aplicación en punción alar debe utilizarse el diluyente Unisolve.

Indicaciones

Inmunización de pollas de reemplazo (reproductoras) contra la anemia.

Edad y vías de administración

Vacunar pollas saludables de 6 semanas en adelante.

Para inyecciones intramusculares o subcutáneas

Reconstituye la vacuna en el diluyente Dilavia de Intervet. Una cantidad seleccionada de diluyente se utilizará en un número de dosis por frasco (200 ml por 1000 dosis). Administrar 0.2 ml de la vacuna vía inyección intramuscular o subcutánea.

Para aplicación por el método de punción alar.

Reconstituya la vacuna en el diluyente Unisolve de Intervet. Una cantidad seleccionada de diluyente se utilizará en un número de dosis por frasco (13 ml por 1000 dosis). Sumerja la doble aguja antes de vacunar cada ave, de manera que ambos surcos sean llenados. Se inserta la aguja desde debajo hasta la piel del ala.



Para aplicaciones por la vía intramuscular o subcutánea en combinación con las vacunas inactivas para aves de Intervet

Reconstituya 1000 dosis de NOBILIS CAV P4 con 2 ml de agua destilada o diluyente Nobilis FD poultry (Intervet) e inyectar asépticamente en vacunas de emulsiones de aceite inactivadas (1000 dosis). Se combina agitando la botella para que la fracción acuosa de la vacuna se combine con la emulsión de aceite. Administrar 0.5 ml de la vacuna mezclada por inyección intramuscular o subcutánea.

Programa de vacunación

El tiempo óptimo y el método de administración dependen de la situación local. Además, se debe tener en cuenta la recomendación de un veterinario. La vacuna puede ser administrada a pollos desde las 6 semanas de edad en adelante. Para estar seguros de que los niveles adecuados de anticuerpos estén presentes en el momento de la postura (huevos), las aves reproductoras tienen que ser vacunadas por lo menos 6 semanas antes de esta fecha probable del inicio de la postura.

Vacunas contra la Anemia Infecciosa pueden ser combinadas con las vacunas contra la REO (por la ruta intramuscular o subcutánea) línea Nobilis Reo, o con vacunas contra la Viruela o la combinación de Viruela con Encefalomiелitis aviar en aves (por la ruta punción alar) o con vacunas inactivas para reproductoras de Intervet, e.g. Nobilis REO+IB+G+ND, Nobilis RT+IBmulti+G+ND o la línea Breedervac (por la ruta intramuscular o subcutánea).

Inmunidad

La inducción de altos niveles de anticuerpos neutralizantes depende generalmente de la salud y condición de las aves. La higiene y la administración son también importantes en el período post vacunación. Las aves reproductoras deben de ser vacunadas al menos 6 semanas antes del período de postura (huevos). Si la vacunación se llevó a cabo de manera correcta, la inmunidad se establecerá 6 semanas postvacunación y los niveles de anticuerpos protectores se mantendrán por al menos todo el tiempo de la postura (huevos).



Período de retiro

Ninguno

Precauciones:

- Lavar y desinfectar las manos y el equipo luego de vacunar. Cualquier residuo de la vacuna debe ser destruido, ya sea quemándolo o hirviéndolo.
- Vacunar solo a animales saludables.
- La vacuna debe ser usada dentro de 2 horas luego de la reconstitución.
- Evite vacunar aves menores de seis semanas.

Condiciones de almacenamiento

Almacenar la vacuna en lugares oscuros entre 2-8°C., y el diluyente Dilavia a una temperatura entre 15 – 25°C

Presentaciones

Frasco vial conteniendo 1000 dosis y Frasco Dilavia x 200ml.

Fabricado por:

Intervet International B.V. - Boxmeer – Holanda

Importado y distribuido por:

Intervet S.A.

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Of.1901

Santiago de Surco, Lima Perú

Bajo Licencia de Intervet International B.V.

Mantener fuera del alcance de los niños

Venta bajo receta médica

Solo para Uso Veterinario

Registro SENASA: B.01.1.01.I.0654

Intervet S.A.

Av. Circunvalación del Club Golf
Los Incas 134, Torre 2, Of.1901
Santiago de Surco, Lima Perú
T +51 1 411 5100

www.msd-animal-health.com.pe

