



# NOBILIS CORVAC 4

## Ficha técnica

Vacuna inactivada para inmunizar aves contra la infección por Coryza. La vacuna contiene bacterias inactivadas de los serotipos A, B, variante B y C del *Avibacterium paragallinarum*.

---

### **Composición:**

*Avibacterium paragallinarum*:

Cepa 083 (serotipo A)	al menos 1 dosis protectora 70% de pollos
Cepa Spross (serotipo B)	al menos 1 dosis protectora 70% de pollos
Cepa H-18 (serotipo C)	al menos 1 dosis protectora 70% de pollos
Cepa 48 (serotipo B variante)	al menos 1 dosis protectora 70% de pollos
Excipientes c.s.p.	1 dosis (0.5 ml)

### **Formulación:**

Los componentes activos están suspendidos en un adyuvante oleoso de lenta liberación.

### **Indicaciones**

Inmunización activa de pollas para reducir la infección y los signos clínicos causados por *Avibacterium paragallinarum*.

Las pollitas son vacunadas dos veces para estimular una protección homóloga (serotipo - específico) contra el serotipo incorporado en la vacuna. Se ha demostrado que la vacuna protege desde las tres semanas hasta al menos 49 semanas después de su administración.

### **Edad de vacunación:**

Inyectar a las aves a partir de las 3 semanas de edad en adelante con 0.5 ml de vacuna y revacunar no más tarde de 4 semanas antes del inicio de la postura. El intervalo entre vacunaciones contra Coryza infecciosa debe ser al menos de 6 semanas.



**Vía de administración:**

Inyección vía subcutánea en la parte baja del cuello.

Antes de su uso, la vacuna debe estar a temperatura ambiente (20 – 25°C)

**Reacciones vacunales:**

Las aves pueden estar menos activas 5 horas después de la vacunación, pero las mismas vuelven a la normalidad al día siguiente.

Puede observarse una leve hinchazón transitoria en el sitio de inyección en la mayoría de los animales dentro de la primera semana posterior a la vacunación, la que posteriormente desaparece en forma gradual.

**Presentación:**

Frascos PET de 500 ml conteniendo 1000 dosis

**Almacenamiento:**

2- 8 °C y evitar el congelamiento

**Precauciones:**

- Vacunar sólo animales saludables
- Agitar bien el frasco de vacuna antes de su uso
- Usar equipo de inyección esterilizado
- Una vez abierta la vacuna utilizar todo el contenido
- Después de abierto los envases de la vacuna éstos deben usarse en un período no mayor a tres horas
- Si el personal se inyectara por accidente, podría ocasionarse una reacción local. Se recomienda acudir e informar al doctor que la vacuna es una emulsión oleosa.

**Contraindicaciones y advertencias:**

No se dispone de información sobre la seguridad y eficacia del uso concurrente de esta vacuna con ninguna otra, a excepción de Nobilis IB+ND+EDS ó Nobilis IBmulti+ND+EDS. Por lo tanto, se recomienda no utilizar Nobilis Corvac 4 conjuntamente con otras.

En ausencia de estudios de compatibilidad, esta vacuna no debe ser mezclada con otros productos veterinarios.



**Información adicional:**

Los frascos usados y parcialmente usados deben desecharse de acuerdo con las regulaciones locales.

**Tiempo de retiro:**

Cero días.

**FABRICADO POR:**

Intervet International B.V. Boxmeer - Holanda

**IMPORTADO POR:**

**Intervet S.A.**

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Of.1901

Santiago de Surco, Lima Perú

Bajo Licencia de Intervet International B.V.,

**Mantener fuera del alcance de los niños.**

**Venta bajo receta médica.**

**USO VETERINARIO**

**Registro SENASA: B.01.4.01.I.0795**