



NOBILIS MG 6/85

Ficha técnica

Vacuna viva para una activa inmunización de futuras pollitas de postura para reducir los signos clínicos de la infección con *Mycoplasma gallisepticum*.

Composición:

Componentes activos por dosis:

<i>Mycoplasma gallisepticum</i> vivo cepa 6/85	≥ 10E ^{6.9} UFC
Excipientes c.s.p.	1 dosis

Formulación:

Pastilla liofilizada.

Indicación:

Activa inmunización de futuras ponedoras para reducir signos clínicos de la infección de *Mycoplasma gallisepticum*. La vacuna no da resultados positivos en la prueba en placa.

Edad de vacunación:

La vacuna es administrada en una simple dosis desde las seis semanas en adelante.

Dosis:

Una dosis por ave.

Vía de administración:

Para que la vacuna sea efectiva, deberá ser administrada vía *spray con gota fina < 20 micras* a animales sanos en un adecuado ambiente y bajo un buen manejo.

Periodo de retiro:

Ninguno.



Presentación:

Viales cada uno conteniendo 1000 dosis.

Almacenamiento:

Almacenar entre 2-8°C. Proteger de la luz.

Precauciones:

- Lavar y desinfectarse las manos y el equipo después de la vacunación.
- Vacunar sólo aves sanas. y negativas a MG, previamente se recomienda verificar el estado del lote utilizando la prueba rápida en placa, en casos hubiera falsos positivos corroborar con la prueba de ELISA.
- Cada vial deberá ser usado inmediatamente después de abrirlo.

Contraindicaciones y advertencias:

- No administrar la vacuna dentro de las cuatro semanas al inicio de la postura.
- Un intervalo mínimo de dos semanas se requerirá entre el uso de esta vacuna con otras vacunas contra enfermedades del tracto respiratorio (por ejemplo, la enfermedad de Newcastle, Bronquitis Infecciosa, Metapneumovirus aviar, etc.).
- No medicar las aves con ninguna droga antibiótica, especialmente con actividad antimicoplásmica, durante los cinco días previos o las dos semanas siguientes a la vacunación.
- Utilizar agua declorinada o agua destilada.

Información adicional:

- Sólo para tratamiento animal.
- Todas las aves susceptibles de una granja deberán ser vacunadas al mismo tiempo.
- Esforzarse en hacer reducir el estrés durante e inmediatamente después de la vacunación.
- No mezclar la vacuna con ninguna otra sustancia.
- No diluir la vacuna para extender el número de dosis de un vial.
- Use todo el contenido una vez abierto el vial.
- No almacenar parte de los envases usados para posteriores usos.
- Una buena práctica de vacunación es cuando en el manejo de la vacuna se evita el contacto con los ojos, manos y ropa.
- Mantener fuera del alcance de los niños.



- La *cepa Mg 6/85* no es patogénica para pavos, pero tener cuidado durante el uso de la vacuna y manejo en los pollos, así como mantener los niveles de bioseguridad.
- Eliminar todo o parte de los viales usados de acuerdo con las regulaciones locales.

Fabricado por:

Intervet International B.V., - Boxmeer - Holanda

Importado por:

Intervet S.A.

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Of.1901

Santiago de Surco, Lima Perú

Bajo Licencia de Intervet International B.V.,

Venta bajo receta médica.

USO VETERINARIO

Registro SENASA: B.01.4.01.140
