



# NOBILIS SALENVAC ETC

## Ficha técnica

Vacuna inactivada para inmunizar aves para reducir la excreción fecal e infecciones de pollo por *S. Enteritidis* PT4 y *S. typhimurium* DT104 y *Salmonella Infantis* cepa A, S03499-06, suspensión para inyección, para pollos

### Composición:

<u>Constituyentes activos</u>	<u>por dosis (0.5 ml)</u>
Células inactivadas de <i>Salmonella enteritidis</i> PT 4	1 R.P.
Células inactivadas de <i>Salmonella typhimurium</i> DT104	1 R.P.
Células inactivadas de <i>Salmonella infantis</i> cepa A, S03499-06	1 R.P.
Excipientes c.s.p	1 dosis.

### Formulación:

Los componentes activos están suspendidos en un adyuvante de **hidróxido de aluminio**

### Indicaciones:

Para la inmunización activa de pollos para reducir la colonización y excreción fecal de *S. enteritidis* (serogrupo D), *S. typhimurium* y *S. heidelberg* (serogrupo B), *S. infantis*, *S. hadar* y *S. virchow* (serogrupo C).

### Inmunidad:

Aparición de la inmunidad: 4 semanas después de la segunda administración.  
Duración de la inmunidad: hasta las 100 semanas de edad.

### Contraindicaciones:

Ninguna

### Reacciones adversas:

La vacunación puede, muy comúnmente producir nódulos pequeños y transitorios (hasta de 8 mm de tamaño) en el sitio de inyección. Estos nódulos desaparecen completamente en un tiempo de 2 semanas después de la vacunación.



**Especies de destino.**

Pollitas de reemplazo

**Dosis y método de administración.**

Inyección intramuscular en la pechuga de una dosis de 0.5 ml a partir de las 6 semanas de edad seguida por una segunda vacunación de una dosis de 0.5 ml por lo menos 4 semanas después. La segunda vacunación debe de ser administrada no más tarde que 3 semanas antes del inicio de la postura.

**Consejos para una administración correcta:**

Agite bien antes de su uso.

Las jeringas y agujas deben de estar estériles antes de su uso. Siga los procesos estándares de asepsia.

Las medidas de higiene y buenas prácticas de manejo deben de ser una parte importante del programa de control para reducir la incidencia de infecciones por Salmonella.

**Periodo de retiro:**

Cero días

**Precauciones especiales de almacenamiento:**

Manténgase fuera de la vista y alcance de los niños.

Almacenar en la parte oscura del refrigerador entre 2 - 8 ° C.

No se congele.

Protéjase de la luz

Periodo de vida: después de abrir el contenedor la primera vez: 3 horas

**Precauciones especiales si son necesarias:**

Vacune solamente animales saludables.

En caso de auto-inyección accidental, busque ayuda médica inmediatamente y muéstrele el inserto del empaque o etiqueta al médico.

No utilizar en aves en postura.

No existe información disponible sobre la seguridad y eficacia de esta vacuna con cualquier otro producto medicinal veterinario. La decisión para la utilización de esta vacuna antes o después de cualquier otro producto medicinal veterinario requiere por lo tanto ser tomada caso por caso.

No mezcle con ningún otro producto medicinal veterinario.

**Presentación:**

Frascos de 500 ml conteniendo 1000 dosis

**Almacenamiento:**

2- 8 °C, evitar el congelamiento y proteger de la luz solar.

**Intervet S.A.**  
Av. Circunvalación del Club Golf  
Los Incas 134, Torre 2, Of.1901  
Santiago de Surco, Lima Perú  
T +51 1 411 5100  
[www.msd-animal-health.com.pe](http://www.msd-animal-health.com.pe)



**Información adicional:**

Los frascos usados y parcialmente usados deben desecharse de acuerdo con las regulaciones locales.

**FABRICADO POR:**

Intervet International B.V. Boxmeer - Holanda

**IMPORTADO POR:**

**Intervet S.A.**

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Of.1901

Santiago de Surco, Lima Perú

Bajo Licencia de Intervet International B.V.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta médica.

**USO VETERINARIO**

**Registro SENASA: B.16.N.01.I.0005**