



NOBILIS SALENVAC T

Ficha técnica

Vacuna inactivada para inmunizar aves para reducir la excreción fecal e infecciones de pollo por *S. Enteritidis* PT4 y *S. typhimurium* DT104.

Composición:

<u>Constituyentes activos</u>	<u>por dosis (0.5 ml)</u>
Células inactivadas de <i>Salmonella enteritidis</i> PT 4	1 x 10 ⁹ células (1 R.P.)
Células inactivadas de <i>Salmonella typhimurium</i> DT104	1 x 10 ⁹ células (1 R.P.)
Excipientes c.s.p.	1 dosis

R.P. = potencia relativa

Formulación:

Los componentes activos están suspendidos en un adyuvante de **hidróxido de aluminio**

Indicaciones:

Protección contra la infección por *S. enteritidis* y *S. typhimurium* en pollas de reemplazo.

La vacunación proveerá protección contra *S. enteritidis* y *S. typhimurium* desde las 4 semanas después de la segunda administración hasta las 57 a 60 semanas aproximadamente.

Edad de vacunación:

Dos vacunaciones con un intervalo de 4 semanas deben ser aplicadas. La edad recomendada para la vacunación es 12 y 16 semanas de edad.

En parvadas provenientes de Padres reproductores sin vacunar y no infectados, la vacuna ha mostrado ser eficaz al día de edad (0.1 ml) y luego reforzar con una dosis de 0.5 ml 4 semanas más tarde. En circunstancias excepcionales puede ser considerada necesaria la aplicación al día de edad.

Medidas higiénicas y de bioseguridad debe aplicarse como una parte importante de un programa de control para reducir la incidencia de la infección de *Salmonella*.



Vía de administración:

Inyección intramuscular en los músculos de la pechuga

Dosis:

0.5 ml en aves de 4 semanas de edad o mas.

Periodo de retiro:

Ninguno

Presentación:

Frascos de 500 ml conteniendo 1000 dosis

Almacenamiento:

2- 8 °C, evitar el congelamiento y proteger de la luz solar.

Precauciones:

- Vacunar sólo animales saludables
- Antes de su uso, la vacuna debe estar a temperatura ambiente (20 – 25°C)
- Agitar bien el frasco de vacuna antes de su uso
- Usar equipo de inyección esterilizado
- Una vez abierta la vacuna utilizar todo el contenido
- Después de abierto los envases de la vacuna éstos deben usarse en un período no mayor a tres horas
- No mezclar con otras vacunas
- Si el vacunador se inyectara por accidente, podría ocasionarse una reacción local. Se recomienda acudir al doctor e informarle que la vacuna es una emulsión acuosa.

Contraindicaciones y advertencias:

Cuando se usa de acuerdo con las instrucciones, ninguna

Información adicional:

Los frascos usados y parcialmente usados deben desecharse de acuerdo con las regulaciones locales.

Intervet S.A.
Av. Circunvalación del Club Golf
Los Incas 134, Torre 2, Of.1901
Santiago de Surco, Lima Perú
T +51 1 411 5100
www.msd-animal-health.com.pe



FABRICADO POR:

Intervet International B.V. Boxmeer - Holanda

IMPORTADO POR:

Intervet S.A.

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Of.1901

Santiago de Surco, Lima Perú

Bajo Licencia de Intervet International B.V.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta médica.

USO VETERINARIO

Registro SENASA: B.01.4.01.I.0744