



NOBIVAC FELINE 2-FeLV

Ficha técnica

Nobivac Feline 2-FeLV es una vacuna que se recomienda para la vacunación de gatos sanos como una ayuda en la prevención de los tumores linfoides y las enfermedades asociadas con la infección por el virus de la leucemia felina (FeLV). La vacunación con este producto previene la viremia persistente en gatos expuestos al virus virulento de la leucemia felina. El virus de la leucemia felina, subgrupos A y B, se produce en cultivos celulares. El virus se inactiva químicamente y se combina con un adyuvante patentado elaborado para mejorar la respuesta inmune.

Composición

Cada dosis contiene:

Virus de la Leucemia Felina (FeLV), Aislamiento <i>Rickard</i>	≥1.0 RP
Excipientes c.s.p.	1 dosis (1 ml)

Dosis y administración:

Antes de utilizar, permita que Nobivac Feline 2-FeLV alcance la temperatura ambiente; agitar bien. Usar todo el contenido inmediatamente.

Se requieren dos dosis para la inmunización primaria.

Para la vacunación inicial: Inyectar una dosis (1 ml) por vía subcutánea o intramuscular a las 9 semanas de edad o mayores.

Segunda vacunación: Inyectar una dosis (1 ml) por vía subcutánea o intramuscular 3 a 4 semanas después de la vacunación inicial.

Revacunar cada dos años con una sola dosis de Nobivac Feline 2- FeLV.

Los gatos están protegidos contra la viremia persistente FeLV durante al menos dos años después de la vacunación.

Precauciones:

- Use agujas y jeringas nuevas, esterilizadas con métodos no químicos.
- No se mezcle con otras vacunas.
- El uso de un biológico puede producir anafilaxis y/u otras reacciones de hipersensibilidad inflamatoria inmune mediada. Antídoto: Epinefrina, corticosteroides y antihistamínicos pueden ser indicados dependiendo de la naturaleza y severidad de la reacción.



- Algunos informes indican que, en los gatos, la administración de ciertos productos biológicos veterinarios puede inducir el desarrollo de fibrosarcomas en el sitio de la inyección.
- Es importante tener en cuenta que ciertas condiciones y eventos pueden causar que algunos gatos no puedan desarrollar o mantener una adecuada respuesta inmune después de la vacunación con FeLV.

La exposición previa a la enfermedad o la latencia de ésta, son las condiciones en las que la vacunación no puede alterar el curso de la enfermedad. Por lo tanto, se recomienda realizar las pruebas de diagnóstico de todos los gatos para el antígeno de FeLV antes de la vacunación. Además, la vacunación con este producto no ofrece protección cruzada contra el virus de la inmunodeficiencia felina (FIV), otro retrovirus felino.

Es importante informar al dueño del gato de estas situaciones antes de la vacunación.

- Contiene gentamicina y anfotericina B como conservadores.
- Incinere los recipientes de la vacuna y todo el contenido sobrante.

Advertencia: No vacunar hembras preñadas.

Temperatura de almacenamiento:
Almacene entre 2° y 7°C. No congele.

Fabricado por:
Intervet Inc.
Merck Animal Health: División de Intervet Inc.
Omaha NE, 68103 USA.
US Veterinary License No. 165A.

Importado y distribuido por:
Intervet S.A.
Av. Circunvalación del Club Golf los Incas 134, Torre 2, Of. 190,
Santiago de Surco, Lima - Perú
RUC: 20372399687
Bajo Licencia de Intervet International B.V.,
Mantener fuera del alcance de los niños.

Intervet S.A.
Av. Circunvalación del Club Golf los
Incas. 134, Torre 2, Oficina 1901.
Santiago de Surco, Lima, Perú
T +51 1 411 5100
www.msd-animal-health.com.pe



Producto veterinario de venta "Bajo receta" expedida por un Médico Veterinario.

Formulación y presentación

Cajas conteniendo 25 frascos de Nobivac Feline 2 FeLV por una dosis.

USO VETERINARIO

Registro SENASA: B.10.0.17.I.1190