



NOBIVAC KC

Ficha técnica

Vacuna viva atenuada de aplicación intranasal contra los 2 agentes más importantes causantes del síndrome de la tos de perrera: virus de Parainfluenza canina (PiC) y Bordetella bronchiseptica (Bb).

Se obtiene una protección parcial a las 48hrs. postvacunación y una inmunidad completa (inmunidad local y sistémica) después de 72 hrs. sin necesidad de refuerzo. La inmunidad dura aprox. 1 año, pero se recomienda la revacunación de perros de alto riesgo cada 6 meses (razas braquicefalicas y animales de criaderos y hospedajes).

Composición

Contiene al menos

<i>Bordetella bronchiseptica</i> cepa viva B-C2	10 ^{8.3} UFC
Virus de la Parainfluenza canina	10 ^{2.8} DICT ₅₀
<i>Excipientes c.s.p.</i>	(0.4 ml) 1 dosis

Esquema de vacunación

Aplicar al menos una dosis 72 hrs antes de un periodo de riesgo. o conjuntamente con la Puppy DP a las 4-6 semanas. Los perros deben tener por lo menos 2 semanas de edad. La revacunacion se aplica antes de cada periodo de riesgo o anualmente

Método de administración

Permita que el diluyente alcance a la temperatura ambiente. Reconstituya la vacuna liofilizada en forma aséptica con el diluyente estéril. Una vez reconstituida la vacuna, cambie la aguja por el aplicador incluido. Fije la cabeza del perro en una posición vertical normal. Coloque el aplicador frente a uno de los orificios nasales y cuidadosamente administre toda la dosis (0.4ml) dentro de la fosa nasal. La vacuna debe ser usada en la siguiente hora después de su reconstitución. Vacunar exclusivamente perros sanos y antes de la vacunación realizarles un examen clínico. La vacuna es segura en hembras gestantes



Inmunidad y protección

Se obtiene una protección parcial a las 48hrs. postvacunación y una inmunidad completa (inmunidad local y sistémica) después de 72 hr. sin necesidad de refuerzo. La inmunidad dura aprox. 1 año, pero se recomienda la revacunación de perros de alto riesgo cada 6 meses (razas braquiocefálicas y animales de criaderos y hospedajes).

Compatibilidad

No administrar juntamente con otro tratamiento intranasal ni antibióticos

Efectos secundarios

En cachorros susceptibles muy jóvenes puede producirse ocasionalmente descarga nasal y ocular leve y transitoria post vacunación.

Almacenamiento

La vacuna debe ser almacenada en la oscuridad a temperaturas entre +2°C y +8°C

Formulación y presentación

Cajas con 05 viales por una dosis con diluyente

FABRICADO POR:

Intervet International B.V., - Holanda

IMPORTADO POR:

Intervet S.A.

Av. Circunvalación del Club Golf los Incas 134, Torre 2, Oficina 1901,
Santiago de Surco, Lima.

Bajo Licencia de Intervet International B.V.,

Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta médica.

USO VETERINARIO

Registro SENASA: B.01.6.03.I.328