



NOBIVAC RL

Ficha técnica

Vacuna inactivada contra la Rabia y *Leptospirosis* (serovar *L. Canicola* y *L. Icterohaemorrhagiae*) en el perro

Composición

Cada dosis contiene:

<i>L. Canicola</i> cepa inactivada CA-12-000	≥ 40 DP ₈₀ de hámster,
<i>L. icterohaemorrhagiae</i> cepa inactivada 820K	≥ 40 DP ₈₀ de hámster
Virus de la rabia inactivado cepa Pasteur	≥ 3 U.I.
Adyuvante: Fosfato de aluminio.	
Excipientes <i>c.s.p.</i>	1 ml.

Método de administración

Se administra una dosis de 1 ml de la vacuna por vía s.c, en la región del pecho o del cuello.

Nobivac RL también puede ser usado como reconstituyente de las vacunas liofilizadas de la línea de vacunas caninas de Intervet (Nobivac Puppy DP y Nobivac DHPPi)

Programas de vacunación

Estas recomendaciones solo sirven como una guía, aunque las condiciones locales puedan requerir un enfoque específico.

Las recomendaciones siguientes se incluyen como quiera que es probable que la inmunización con Nobivac RL funcione como parte de un programa de vacunación más exhaustivo.

- a. Programa para cachorros con altos niveles de inmunidad materna al parvovirus
- | | | |
|---------------------|---|---|
| 8/9 semanas de edad | → | Nobivac Parvo-c y Nobivac Lepto |
| 12 semanas de edad | → | Nobivac DHPPi y Nobivac Lepto
o Nobivac RL |



- b. Donde es posible la exposición a Distemper (y/o Rabia) antes de las 12 semanas de edad:
- 8/9 semanas de edad → Nobivac DHP o Nobivac DHPPi y Nobivac Lepto (o Nobivac RL en caso de una posible exposición temprana a la Rabia)
 - 12 semanas de edad → Nobivac DHPPi y Nobivac Lepto o Nobivac RL (repetir la vacunación con Rabia para garantizar la protección de los cachorros con inmunidad materna contra la Rabia)
- c. Donde la vacunación no se comienza hasta las 12 semanas de edad:
- 12 semanas de edad → Nobivac DHP o Nobivac DHPPi o Nobivac Lepto o Nobivac RL
 - 14-15 semanas de edad → Nobivac Lepto

Revacunación

Se recomienda que los perros sean revacunados contra:

Rabia → cada 3 años (puede ser modificado para cumplir con normas locales)

Leptospirosis → cada año

En caso de que la vacunación contra parainfluenza tenga que ser incluida en el programa, se aconseja la revacunación anual con **Nobivac DHPPi + Nobivac Lepto** y Nobivac **DHPPi + Nobivac RL** cada tres años.

Almacenamiento

La vacuna debe ser almacenada en la oscuridad a temperaturas entre +2°C y +8°C

Formulación y presentación

Vacuna Líquida en frascos de 1 ml por 1 dosis.

FABRICADO POR:

Intervet International B.V., - Holanda

Intervet S.A.
Av. Circunvalación del Club Golf Los
Incas 134, Torre 2, Oficina 1901.
Santiago de Surco, Lima - Perú
T +51 1 411 5100
www.msd-animal-health.com.pe



IMPORTADO POR:

Intervet S.A.

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Oficina 1901

Santiago de Surco, Lima - Perú

Bajo Licencia de Intervet International B.V.,

Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta médica.

USO VETERINARIO

Registro SENASA: B.01.6.15.I.0815