



NOBIVAC TRICAT TRIO

Ficha técnica

Vacuna viva contra el Herpes virus Felino tipo 1 (HVF), Calicivirus Felino (CVF) y Panleucopenia Felina (PLF).

Composición

Cada dosis contiene:

Virus atenuado de HVF tipo 1 cepa G2620A	$\geq 5.2 \log_{10}$ UFP*
Virus atenuado de CVF cepa F9	$\geq 4.6 \log_{10}$ UPF*
Virus atenuado de PLF cepa MW-1L	$\geq 4.3 \log_{10}$ DICC ₅₀ **
Excipientes c.s.p.	1 ml.

*UFP: Unidades formadoras de placas; **DICC: Dosis infectiva de Cultivo de tejido

Esquema de vacunación

Vacunación básica: 2 aplicaciones con un intervalo de 3 – 4 semanas. La primera aplicación puede ser 8 – 9 semanas y la segunda aplicación a las 12 semanas.

Revacunación, Una dosis al año.

Método de administración

Reconstituir un vial de Nobivac Tricat Trio con el Diluyente estéril o Nobivac Rabies y administrar 1 ml por vía s. c

Almacenamiento

La vacuna debe ser almacenada en la oscuridad a temperaturas entre +2°C y +8°C

Formulación y presentación

Cajas conteniendo 5 frascos de Nobivac Tricat Trio por una dosis con el mismo número de diluyentes estériles.

Intervet S.A.

Av. Circunvalación del Club
Golf Los Incas 134, Torre 2
Of. 1901 Santiago de Surco -
Lima
T +51 1 411 5100

www.msd-animal-health.com.pe



FABRICADO POR:

Intervet International B.V., - Holanda

IMPORTADO POR:

Intervet S.A.

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2 Of. 1901

Santiago de Surco - Lima

Bajo Licencia de Intervet International B.V.,

Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta médica.

USO VETERINARIO

Registro SENASA: B.01.8.17.I.0975