



PENCIVET LPU

Ficha técnica

Antibacteriano inyectable listo para usar, que contiene Bencilpenicilina Procaínica, Bencilpenicilina Benzatínica y Dihidroestreptomocina asociada a un antiinflamatorio no esteroide, Piroxican.

Composición

Cada 100 ml contiene:

Bencilpenicilina Procaínica	10'000,000	U.I.
Bencilpenicilina Benzatínica	10'000,000	U.I.
Sulfato de Dihidroestreptomocina	10.5	g.
Piroxican	1.0	g.
Excipientes c.s.p.	100	ml.

Indicaciones

Para el tratamiento de las infecciones primarias y secundarias producidas por bacterias Gram positivas y Gram negativas, sensibles a la Bencilpenicilina y Dihidroestreptomocina, acompañado por procesos crónicos y agudos de inflamación. Preventivo de las infecciones post quirúrgicas y post parto.

Bovinos: Enteritis, neumonías, tétanos, mastitis, nefritis, metritis, pasteurolosis, carbunco sintomático, ántrax, actinomicosis, brucelosis, infecciones y artritis piogénica, salmonelosis, abscesos purulentos

Equinos: Enteritis, neumonías, tétanos, nefritis y metritis, salmonelosis, linfangitis ulcerativa, diarrea septicémica, abscesos purulentos.

Caprinos: Enteritis, neumonías, tétanos, mastitis, queratoconjuntivitis, nefritis y metritis, pasteurolosis, carbunco sintomático, actinobacilosis, leptospirosis, listeriosis, actinomicosis, sinovitis, brucelosis, salmonelosis, infecciones y artritis piogénica, abscesos purulentos

Ovejas: Enteritis, neumonías, tétanos, mastitis, queratoconjuntivitis, nefritis y metritis, pasteurolosis, carbunco sintomático, ántrax, listeriosis, actinomicosis,



brucelosis, salmonelosis, absceso purulento,

Cerdos: Neumonías, poliartritis infecciosa, erisipela, rinitis atrófica, síndrome MMA, nefritis abscesos purulentos, paratifoidea

Dosis y Vía de Administración

10 ml para 85 a 250 Kg. de peso vivo, lo que equivale a 1 ml por 8.5 a 25 Kg. de peso, por vía intramuscular profunda

Advertencias:

No administrar Pencivet LPU a través de otra vía que no está indicada
No utilizar otros antiinflamatorios durante el tratamiento con Pencivet LPU
Almacenar entre 2 - 8 °C.

Período de retiro

Carne: 30 días
Leche: 120 horas (8 a 10 ordeños)

Presentación

Frascos de: 50 ml

Intervet S.A.
Av. Circunvalación del Club Golf
Los Incas 134, Torre 2, Of. 1901,
Santiago de Surco, Lima - Perú
T +51 1 411 5100
www.msd-animal-health.com.pe



FABRICADO POR:

Intervet Productions S.R.L. – Aprilia - Italia.

IMPORTADO POR:

Intervet S.A.

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Of. 1901

Santiago de Surco, Lima – Perú.

Bajo Licencia de Intervet International B.V.,

Mantener fuera del alcance de los niños.

USO VETERINARIO

Venta bajo receta médica.

Registro SENASA: F.03.01.I.0688