



# REVALOR 200

## Ficha técnica

Implante anabólico para el finalizado de los bovinos de engorda.

### Composición

Contiene:

Acetato de trenbolona	200 mg.
Estradiol	20 mg
Excipientes c.s.p.	1 implante*

\*: 1 implante = 10 *pellets*

### Indicaciones de uso

Mejora la eficiencia en la alimentación y aumenta la velocidad de ganancia de peso de novillas y novillos alimentados en confinamiento (Feed lot).

### Cantidades que se deben administrar y vía de administración

Se administra un implante (= 10 *pellets*) por vía subcutánea a cada animal. El implante se coloca debajo de la piel en el área posterior de la oreja con la ayuda de un implantador especial.

Los diez *pellets* que conforman la dosificación de REVALOR 200, están contenidos en una división del cartucho de dosis múltiples. En cada cartucho hay diez dosis. El cartucho está diseñado para ser utilizado con un implantador especial, y el implante se coloca debajo de la piel en el área posterior de la oreja

### Sobredosis

En caso de sobredosis, no se observa ningún efecto adverso a excepción de la reducción del peso del timo. En novillos se observó un aumento en el peso de la próstata y las vesículas seminales. En novillas se observó una disminución en el peso de los ovarios y el útero. Esto está asociado con la actividad hormonal del producto.

Intervet S.A.

Av. Circunvalación del Club Golf  
Los Incas 134, Torre 2, Of. 1901  
Santiago de Surco, Lima - Perú.

T +51 1 411 5100

[www.msd-animal-health.com.pe](http://www.msd-animal-health.com.pe)



### **Contraindicaciones**

No utilizar en animales preñados.

No utilizar en animales lactantes.

No utilizar en animales reproductores.

No utilizar en terneros lactantes que serán procesados para consumo humano.

### **Advertencias especiales**

No se conocen.

### **Precauciones especiales para el uso**

#### **Precauciones especiales para el uso en animales**

Un implante consta de diez *pellets*. Administrar los diez *pellets* en cada implante por animal.

No se debe utilizar en animales que están destinados a la reproducción o en animales lecheros.

No se debe utilizar en terneros lactantes que serán procesados para consumo humano. No se ha establecido la efectividad y seguridad en terneros para consumo humano.

#### **Precauciones especiales que debe tomar la persona que administra el producto farmacéutico veterinario a los animales.**

Evitar la auto implantación.

### **Reacciones adversas**

No se conocen.

### **Almacenamiento**

Conservar a 25°C, protegido de la luz en un lugar fresco y seco

### **Tiempo de Retiro**

Carne y vísceras: cero días

No utilizar en ganado bovino del cual se obtiene leche para consumo.

**Intervet S.A.**

Av. Circunvalación del Club Golf  
Los Incas 134, Torre 2, Of. 1901  
Santiago de Surco, Lima - Perú.

T +51 1 411 5100

[www.msd-animal-health.com.pe](http://www.msd-animal-health.com.pe)



### **Presentación**

El producto está conformado por un cartucho con diez compartimentos tubulares fabricados de poliestireno translúcido (USP/NF). El cartucho se presenta en un sachet de aluminio de tres capas (PEPT/Aluminio/PE) de grado alimentario. Caja x 10 cartuchos (100 dosis).

### **FABRICADO POR:**

Intervet GesmbH, Viena – Austria.

### **IMPORTADO POR:**

**Intervet S.A.**

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Of. 1901

Santiago de Surco, Lima - Perú.

Bajo Licencia de Intervet International B.V.,

Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta médica.

### **USO VETERINARIO**

**Registro SENASA: F.02.23.I.0037**