



# SOLUTION 3.5% L.A.

## Ficha técnica

Es una asociación de Ivermectina + Abamectina, endectocida de amplio espectro para combatir nemátodos gastrointestinales y pulmonares del ganado vacuno. El producto es acaricida y es efectivo contra las larvas de moscas productoras de nuca y miasis. **Solution® 3.5 % L.A.** ayuda en el control de garrapatas y en la miasis cutánea del ganado vacuno causada por el estado larval de la mosca *Cochliomya hominivorax*.

---

### Composición:

Ivermectina	22.5 mg.
Abamectina	12.5 mg
Excipientes c.s.p	1 ml

### Indicaciones:

Endectocida inyectable de larga acción, tiene una acción de hasta 125 días. Esta indicado para el tratamiento y control de las diferentes especies de nemátodos gastrointestinales y pulmonares, parásitos externos como garrapatas, piojos y ácaros; y como auxiliar en el control de la población de mosca de los cuernos en bovinos, caprinos, ovinos y camélidos sudamericanos.

### Dosis y Administración

Administrar por vía subcutánea 1 ml por cada 50 kg de peso vivo.

### Precauciones

- Use la dosis correcta, conforme se recomienda para el producto.
- Mantenga el producto en el envase original, protegido de la luz y el calor.
- El producto no debe ser utilizado para tratar ganado vacuno en un periodo de 92 días antes de su beneficio.
- No destine la leche de animales tratados para el consumo humano.
- Solo administrar el producto subcutáneamente.
- Almacene el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- No deseche los envases vacíos en ríos o en fuentes de agua. El producto es tóxico para los peces.



### **Período de retiro:**

Carne: 92 días.

Las hembras lactantes no deben ser tratadas cuando la leche sea destinada para consumo humano.

### **Contraindicaciones y limitaciones para su uso.**

- No administrar a vacas lecheras en edad reproductiva
- Un tratamiento tópico específico debe efectuarse en caso de una miasis ya establecida.
- En las infecciones causadas por el *Cochliomya hominivorax*, el tratamiento debe ser profiláctico.
- La Abamectina y la Ivermectina no actúan contra cestodos y trematodos.
- No administre a terneros con edad menores a 16 semanas (4 meses)

### **Interacciones medicamentosas**

El producto no debe ser aplicado simultáneamente con otros medicamentos.

### **Reacciones adversas.**

El producto no causa reacciones adversas mientras se observe los parámetros de dosificación recomendados y especialmente si se usa bajo la dirección de un Médico Veterinario.

**Presentación:** Frasco x 50 y 500 ml

**Intervet S.A.**

Av. Circunvalación del Club Golf  
Los Incas 134, Torre 2, Of. 1901,  
Santiago de Surco, Lima - Perú  
T +51 1 411 5100

[www.msd-animal-health.com.pe](http://www.msd-animal-health.com.pe)



**FABRICADO POR:**

Merck Sharp & Dohme Saude Animal Ltd. - Brazil.

**IMPORTADO POR:**

**Intervet S.A.**

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Of. 1901,

Santiago de Surco, Lima - Perú

Bajo Licencia de Intervet International B.V.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta médica.

**USO VETERINARIO**

**Registro SENASA: F.09.01.I.0186**