



# VALLÉECALCIO

## Ficha técnica.

Es una solución que presenta una formulación completa que satisface las necesidades de Calcio, Fosforo, Magnesio y Glucosa en Bovinos, equinos y caprinos.

---

### Composición

Cada 100 mL contiene\*:

Gluconato de calcio monohidratado	22,83 g
D-sacarato de calcio tetrahidratado	0,0387 g
Lactato de Calcio pentahidratado	3,03 g
Hipofosfito de magnesio hexahidratado	2,00 g
Dextrosa anhidra	5,00 g
Vehículo c.s.p.	100 mL

\*Equivalente a 2,44 g de calcio total, 0,472 g de fósforo y 0,185 g de magnesio.

### Indicaciones:

VALLÉECÁLCIO una solución acuosa inyectable indicada para bovinos, equinos y caprinos que estén presentando sintomatología clínica de:

- Deficiencias de calcio, fósforo y magnesio;
- Hipocalcemia posparto (paresia de la parturienta, fiebre vitular o fiebre de la leche);
- Síndrome de la vaca caída;
- Tetania de los pastos (hipomagnesemia)

### Dosis y Vías de administración:

La dosificación indicada para bovinos, equinos y caprinos es de 1 mL por kg de peso. Las vías de administración recomendadas por especie animal son:

- Bovinos y caprinos: vía endovenosa o subcutánea.
- Equinos: vía endovenosa.

En caso de administración subcutánea, el volumen máximo por local de aplicación es de 20 mL para bovinos y 5 mL para caprinos. Interrumpa la aplicación del producto así que haya reversión del cuadro de hipocalcemia y/o decúbito del animal. Alteraciones en la dosificación y modo de uso es a criterio del Médico Veterinario.

**Intervet S.A.**

Av. Circunvalación del Club Golf  
Los Incas 134, Torre 2, OF. 1901  
Santiago de Surco, Lima.  
T +51 1 411 5100

[www.msd-animal-health.com.pe](http://www.msd-animal-health.com.pe)



**Contraindicaciones.**

Animales portadores de bloqueo Atrio ventricular y otros disturbios cardíacos no deben someterse a terapia con sales de calcio.

**Efectos colaterales**

Pueden ocurrir signos de intoxicación por calcio como disnea y alteraciones del ritmo y frecuencia cardíacos.

**Precauciones**

- Buenas prácticas clínicas minimizan la posibilidad de contaminación del producto;
- Use todo el contenido de un único frasco después de la abertura. No es recomendado guardar el producto para administración posterior;
- No administre en flujo continuo. Administre lentamente cuando sea utilizado por vía endovenosa;
- No mezcle VALLÉECÁLCIO con antibióticos aminoglucósidos, tetraciclinas y sulfato de magnesio debido a su incompatibilidad;
- No utilice VALLÉECÁLCIO en animales con problemas cardíacos o con insuficiencia renal grave;
- Solamente utilice VALLÉECÁLCIO de apariencia límpida, incolora o levemente amarillenta.

**Periodo de retiro**

No corresponde.

**Almacenamiento:**

Mantener protegido de la luz y a una temperatura inferior de 25 °C.

**FABRICADO POR:**

VALLÉE S/A – BRASIL

Montes Claros – Minas Gerais – Brasil.

**Intervet S.A.**

Av. Circunvalación del Club Golf  
Los Incas 134, Torre 2, OF. 1901  
Santiago de Surco, Lima.  
T +51 1 411 5100

[www.msd-animal-health.com.pe](http://www.msd-animal-health.com.pe)



**IMPORTADO POR:**

**Intervet S.A.**

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, OF. 1901  
Santiago de Surco. Lima - Perú.

Bajo Licencia de Intervet International B.V.,

Mantener fuera del alcance de los niños.

LEA EL PROSPECTO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

Venta bajo receta médica.

**USO VETERINARIO**

**Registro SENASA: F.F4.01.I.0091**