



NOBIVAC PUPPY DP PLUS

Ficha técnica

Vacuna combinada viva modificada contra el virus de Distemper canino (DVC) y Parvovirus canino (PVC); sus cepas atenuadas Onderstepoort del DVC y la cepa 630a del PVC, ejercen protección cruzada contra todas las cepas de Distemper y Parvovirus.

Composición

Cada dosis (1 ml) de vacuna reconstituida contiene:

Virus del Distemper canino cepa Onderstepoort atenuada	$\geq 10^{5.1}$ DICT ₅₀ *
Virus del Parvovirus canino cepa 630 ^a	$\geq 10^{5.1}$ DICT ₅₀ *
Excipientes c.s.p.	1 dosis.

*Dosis infecciosa de cultivo de tejido 50%

Indicaciones

Para la inmunización activa de cachorros a partir de las 4 semanas de edad para prevenir los signos clínicos Infección y la mortalidad por el virus de Distemper (moquillo) canino y la infección por Parvovirus canino y para prevenir la excreción viral después de la infección por el virus de Distemper canino y después de la infección por Parvovirus canino.

Inicio de la inmunidad: para Parvovirus canino: 3 días.
para virus del Distemper canino: 7 días.

Duración de la inmunidad: 8 semanas.

Contraindicaciones

Ninguna

Reacciones adversas

Es muy común observar una pequeña inflamación que no causa dolor (máximo 1 cm de diámetro) en el lugar de la inyección durante la primera semana después de la vacunación. La inflamación desaparecerá por completo en unos pocos días. Durante o inmediatamente después de la vacunación, se observa alguna irritación en el lugar de la inyección.



La frecuencia de las reacciones adversas se define utilizando lo siguiente

- muy frecuentes (más de 1 de cada 10 animales tratados presentan reacciones adversas)
- común (más de 1 pero menos de 10 animales en 100 animales tratados)
- poco frecuentes (más de 1 pero menos de 10 animales por cada 1000 animales tratados)
- raro (más de 1 pero menos de 10 animales en 10.000 animales tratados)
- muy raras (menos de 1 animal de cada 10.000 animales tratados, incluidos informes aislados).

Si observa algún efecto adverso, incluso los que no se mencionan en este prospecto o cree que el medicamento no ha funcionado, informe a su veterinario.

Especie objetivo

Cachorros

Dosificación para cada especie, vías y métodos de administración.

Uso subcutáneo.

Administrar una dosis en cachorros a partir de las 4 semanas de edad.

Reconstituir una dosis de un solo vial que contiene liofilizado con el diluyente incluido.

Administrar todo el contenido del vial.

Producto reconstituido: suspensión de color rosada o rosa.

Recomendaciones sobre la administración correcta

Hay que asegurar que el liofilizado esté completamente reconstituido antes de usarse.

Precauciones de almacenamiento

Mantener fuera del alcance de los niños

Liofilizado: Almacenar en refrigeración (2°C – 8°C). No congelar.

Proteger de la luz.

Diluyente: Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de temperatura de almacenamiento. No congelar.

No utilizar el medicamento veterinario después de la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.

Vida útil una vez reconstituido de acuerdo con las instrucciones: 30 minutos



Advertencias especiales

Precauciones especiales para uso en animales:

Vacunar solamente animales saludables.

Niveles moderados a altos de anticuerpos moderados maternos contra el virus de Distemper canino pueden reducir la eficacia del producto contra el Distemper canino.

Precauciones especiales para uso en animales:

En algunos cachorros se puede encontrar la cepa de la vacuna de parvovirus canino en las heces hasta 8 días después de la inoculación. En ocasiones el virus puede propagarse a otros perros, pero sin causar signos clínicos de la enfermedad. Los cachorros vacunados no propagan el virus de Distemper canino.

Almacenamiento

La vacuna debe ser almacenada en la oscuridad a temperaturas entre +2°C y +8°C

Formulación y presentación

Cajas con 5 frascos por una dosis con 5 diluyente estéril (1 ml) incluido

FABRICADO POR:

Intervet International B.V., - Holanda

IMPORTADO POR:

Merck Sharp & Dohme Salud Animal Perú S.A.

Cal. Andrés Reyes 338, Piso 6, San Isidro
Lima 15046- Perú

Bajo Licencia de Intervet International B.V.,

Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta médica.

USO VETERINARIO

Registro SENASA: B.019.001.I.00003